

1. У дитини 2-х років температура 38°C , млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A.** Гостра пневмонія
- B.** Гострий ларингіт
- C.** Назофарингіт
- D.** Бронхіальна астма
- E.** Гострий бронхіт

2. У дитини 2-х років гостро розвився набряк по всьому тулубу. АТ- 120/180 мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі 4,5%, мікрогематурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий гломерулонефрит, нефротична форма
- B.** Ізольований сечовий синдром
- C.** Пієлонефрит
- D.** Вроджена вада серця
- E.** -

3. Хворий 41-го року зловживає алкоголем більше семи років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити мух, павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який діагноз поставить фельдшер ФАПУ?

- A.** Алкогольний делірій
- B.** Маніакально-депресивний психоз
- C.** Старечий параноїд
- D.** Шизофренія
- E.** Епілептичний психоз

4. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 47-ми років, який скаржиться на напади за груднинного болю з іррадіацією в ліву руку, які тривають 2-3 хв, з'являються після фізичного навантаження, знімаються нітрогліцерином. Хворіє 3 роки. Об'єктивно: Ps- 80/хв., ритмічний. АТ- 130/70 мм рт.ст., межі серця в нормі. Шумів немає. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Стенокардія напруження
- B.** Гіпертонічна хвороба, неускладнений гіпертонічний криз
- C.** Гіпертонічна хвороба, ускладнений гіпертонічний криз
- D.** Інфаркт міокарда
- E.** Прогресуюча стенокардія

5. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків миючого засобу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства здійснює за допомогою такого реактиву:

- A.** Фенолфталеїновий
- B.** Амідопіриновий
- C.** Ортотулоїдиновий
- D.** Бензидиновий
- E.** Азопірамовий

6. До фельдшера здоров'я пункту звернулася пацієнтка, яка хворіє на жовчнокам'яну хворобу, зі скаргами на сильний біль у правому підребер'ї. Які засоби домедикаментозної терапії допоможуть зменшити біль?

- A.** Грілка на ділянку правого підребер'я
- B.** Міхур з льодом
- C.** Гірчичники на грудну клітку
- D.** Банки на грудну клітку
- E.** Зігріваючий компрес

7. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- A.** 5400 г
- B.** 5200 г
- C.** 4800 г
- D.** 5800 г
- E.** 6000 г

8. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10-ти років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A.** Менінгококова інфекція
- B.** Скарлатина
- C.** Кір
- D.** Вітряна віспа
- E.** Краснуха

9. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна стати на диспансерний облік. Вагітність 10 тижнів. Вузький таз. Яку медичну документацію повинен оформити фельдшер?

- A.** Індивідуальна карта вагітної та породіллі (ф. №111/0) та обмінна карта (ф.113/0)
- B.** Контрольна карта диспансерного спостереження (ф.30)
- C.** Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/0)
- D.** Обмінна карта (ф.113/0)
- E.** Медична карта стаціонарного хворого (ф.003)

10. Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників, фрезерувальник крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. Об'єктивно: видно затиснутий в руці оголений електричний дріт, який звисає з верстату. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера:

- A.** Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B.** Дати вдихнути нашатирний спирт
- C.** Ввести протигістамінні препарати
- D.** Знеболити, транспортувати в хірургічне відділення
- E.** Дефібриляція

11. До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12-ти років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, зблід і раптово втратив свідомість. Об'єктивно: пульс ниткоподібний, кінцівки холодні. Який стан виник у дитини?

- A.** Непритомність
- B.** Геморагічний шок
- C.** Гостра серцева недостатність
- D.** Колапс
- E.** Гостра дихальна недостатність

12. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом,

стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий під час пальпації. Положення плоду поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене, 16/хв. Яке ускладнення виникло у пологах?

- A.** Загроза розриву матки
- B.** Повний розрив матки
- C.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D.** Розрив промежини
- E.** Центральне передлежання плаценти

13. Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 5 діб. Вчора була виписана з пологового стаціонару. Мати повідомила, що близько 2-х годин тому у дитини піднялась температура тіла до 38,5°C. Об'єктивно: дитина неспокійна, жадібно п'є, відмічається сухість слизових оболонок, гіперемія шкіри. Слизова ротоглотки рожева, дихання над легеньми пуерильне. При зважуванні маса тіла дитини 2800 г. Маса тіла одразу після народження 3200 г. З анамнезу відомо, що вагітність і пологи у матері протікали без ускладнень. Яке явище найімовірніше у дитини?

- A.** Транзиторна гіпертермія
- B.** Транзиторна гіпотермія
- C.** Гостра респіраторна вірусна інфекція
- D.** Гостра кишкова інфекція
- E.** Транзиторний катар кишок

14. Фельдшер ФАПу заповнює медичну документацію на пацієнта 34-х років, який рік тому лікувався в хірургічному відділенні з приводу травми з великою крововтратою. Пацієнт повідомив, що після переливання біля 1000 мл одногрупної резус-сумісної консервованої крові у нього відмічались серцебиття, судоми м'язів, порушення дихання, занепокоєння. Яке ускладнення гемотрансфузії мало місце у хворого?

- A.** Цитратний шок
- B.** Геморагічний шок
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Постгемотрансфузійний шок
- E.** Гострий тромбоз

15. До фельдшера здоров'я звер-

нувся робітник зі скаргами на біль у середній третині передпліччя. Травма дві години тому. Об'єктивно: в середній третині передпліччя відмічається локальний біль, набряк, припухлість, обмеження об'єму рухів у кінцівках, деформація. Якими є межі іммобілізації при наданні першої допомоги?

- A.** Від пальців кисті до нижньої третини плеча
- B.** Від пальців кисті до верхньої третини передпліччя
- C.** Від пальців кисті до верхньої третини плеча
- D.** Від зап'ястка до ліктя
- E.** Від пальців кисті до внутрішнього краю здорової лопатки

16. До фельдшера здоров'я звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст. Пульс частий, малого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен надати фельдшер?

- A.** Покласти холод та госпіталізувати
- B.** Ввести знеболюючі препарати
- C.** Промити шлунок
- D.** Направити в жіночу консультацію
- E.** Направити на УЗД

17. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 40-ка років, який після переохолодження відчув озноб, біль у грудній клітці справа. Підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився кашель із виділенням "іржавого" харкотиння. Хворіє другий день. Після об'єктивного обстеження фельдшер виявив ознаки негоспітальної правобічної лобарної пневмонії. Вкажіть основи етіотропної терапії:

- A.** Антибіотики
- B.** Муколітики
- C.** Антигістамінні
- D.** Глюкокортикостероїди
- E.** Бронхолітики

18. Пацієнтка 27-ми років скаржиться на біль, свербіж, печіння, серозно-гнійні виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки. Який найбільш імовірний діа-

гноз?

- A.** Вульвовагініт
- B.** Ендометрит
- C.** Аднексит
- D.** Параметрит
- E.** Ерозія шийки матки

19. Фельдшер повинен пам'ятати, що максимальна кількість розчину ліків, яку можна ввести одноразово внутрішньом'язово становить:

- A.** 10 мл
- B.** 5 мл
- C.** 2 мл
- D.** 20 мл
- E.** 4 мл

20. Хвора 30-ти років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,7°C. Захворіла раптово після переохолодження. Живіт м'який, болючий в лівій половині. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Які зміни в сечі можна очікувати?

- A.** Піурія
- B.** Гематурія
- C.** Зниження питомої ваги
- D.** Кристалурія
- E.** Глюкозурія

21. Дитина народилася передчасно з вагою 1700 г, від першої ускладненої вагітності. Профілактику якого захворювання слід передбачити при складанні плану догляду за недоношеною дитиною?

- A.** Анемія
- B.** Алергічний діатез
- C.** Гострий розлад травлення
- D.** Гемолітична хвороба
- E.** Спазмофілія

22. Пацієнт 20-ти років годину тому відчув кинджальний біль у животі, було одноразове блювання. Об'єктивно: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Перфорація виразки
- В.** Гострий живіт (перитоніт)
- С.** Шлунково-кишкова кровотеча
- Д.** Гострий гастрит
- Е.** Загострення виразкової хвороби

23. Роділля 24-х років знаходиться в передпологовій палаті. Після 8-ми годин нормальної пологової діяльності, перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився. Яка патологія пологової діяльності?

- А.** Вторинна слабкість пологової діяльності
- В.** Надмірно сильна пологова діяльність
- С.** Патологічний прелімінарний період
- Д.** Первинна слабкість пологової діяльності
- Е.** Дискоординована пологова діяльність

24. У вагітної в 36 тижнів спостерігаються кров'янисті виділення із статевих шляхів, що з'явилися раптово вдома, вночі, серед повного здоров'я. Вкажіть першочерговий захід долікарської допомоги:

- А.** Викликати лікарсько-акушерську бригаду
- В.** Транспортувати в лікарню
- С.** Визначити групу крові та резус фактор
- Д.** Ввести в/в 1% розчин вікасолу
- Е.** Ввести в/в 5% розчин амінокапронової кислоти

25. Фельдшер ШМД виконує внутрішньовенну ін'єкцію 10% р-ну кальцію хлориду. Яке ускладнення може виникнути у разі попадання розчину у підшкірну клітковину?

- А.** Некроз
- В.** Алергійна реакція
- С.** Абсцес
- Д.** Гематома
- Е.** Інфільтрат

26. Фельдшер ФАПу проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плоду?

- А.** Зліва на рівні пупка
- В.** Справа на рівні пупка
- С.** Справа нижче пупка
- Д.** Зліва нижче пупка
- Е.** Справа вище пупка

27. До фельдшера здоровпункту підприємства звернулася жінка 45-ти років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизистогнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,8°C, загальну слабкість. Хворіє протягом 4-х днів. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: перкуторно - ясний легеневий звук, аускультативно - вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно - ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Гостра негоспітальна пневмонія
- В.** Гостра госпітальна пневмонія
- С.** Гострий бронхіт
- Д.** Хронічний бронхіт
- Е.** Бронхоектатична хвороба

28. Хворому з аденомою передміхурової залози фельдшером уведений постійний катетер у сечовий міхур. Яким розчином доцільно промивати сечовий міхур для запобігання висхідної інфекції:

- А.** Розчин фурациліну 1:5000
- В.** 30% етиловим спиртом
- С.** Ізотонічним розчином натрію хлориду
- Д.** 2% розчином натрію гідрокарбонату
- Е.** 3% розчином перекису водню

29. Фельдшер швидкої допомоги викликаний до пацієнта 48-ми років, що скаржиться на одноразове блювання, здуття живота, сильний біль у поперековій ділянці справа, що іррадіацією в статеві органи та живіт, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: хворий неспокійний, стогне, шкіра бліда, вкрита рясним потом. Рс- 90/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Симптом Пастернацького позитивний справа. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Ниркова коліка
- B.** Печінкова коліка
- C.** Кишкова коліка
- D.** Гострий апендицит
- E.** Кишкова непрохідність

30. Хворий 46-ти років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний біль у правій половині живота, поперековій ділянці справа, який іррадіює в калитку та стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об'єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла 36,9°C, Ps- 92/хв. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Ниркова колька
- B.** Гострий гломерулонефрит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Хронічний гломерулонефрит
- E.** Хронічний пієлонефрит

31. Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюр. Об'єктивно: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми?

- A.** Вивих плеча
- B.** Розтягнення зв'язок суглоба
- C.** Розрив м'язів
- D.** Забій м'яких тканин
- E.** Перелом плеча

32. У флаконі 1,0 г цефтриаксону, його розвели 5 мл ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- A.** 1,5 мл
- B.** 2 мл
- C.** 3 мл
- D.** 4 мл
- E.** 5 мл

33. На ФАП звернулася вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Об'єктивно: загальний стан не порушений, АТ- 120/80 мм рт.ст. на обох руках, Ps- 82/хв., ритмічний. При огляді тіло матки в підвищеному то-

нусі, чутливе під час пальпації. Який попередній діагноз?

- A.** Загроза викидня
- B.** Викидень, що розпочався
- C.** Загроза передчасних пологів
- D.** Викидень в розпалі
- E.** Загроза розриву матки

34. В хірургічне відділення доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Призначено переливання одногрупної еритромаси. Під час проведення біологічної проби у пацієнта з'явилися нудота, біль за грудниною і в попереку, пульс і дихання почастишали, артеріальний тиск знизився. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гемотрансфузійний шок під час біологічної проби
- B.** Пірогенна реакція
- C.** Анафілактичний шок
- D.** Цитратний шок
- E.** Гостре розширення серця

35. Хворий 25-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами: на головний біль, набряки на обличчі, сечу кольору "м'ясних помій", тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури до 37,4°C. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі. Ps- 72/хв., ритмічний, напружений. АТ- 180/110 мм рт.ст. Добова кількість сечі - 400 мл. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Гострий пієлонефрит
- C.** Хронічний гломерулонефрит
- D.** Хронічний пієлонефрит
- E.** Гіпертонічна хвороба

36. На прийом до фельдшера ФАПу прийшла мати з дитиною 8-ми років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль під час ковтання. Об'єктивно: гіперемія і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Який попередній діагноз?

- A.** Дифтерія
- B.** Епідемічний паротит
- C.** Стоматит
- D.** Ангіна
- E.** Скарлатина

37. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора 35-ти років, зі скаргами на часте сечовипускання, біль у попереку, підвищення температури до 38,6°C. Хворіє 3 дні. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 120/70 мм рт.ст., Рс- 100/хв., симптом Пастернацького позитивний зліва. У сечі: велика кількість лейкоцитів та бактерій. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A.** Пієлонефрит
- B.** Гломерулонефрит
- C.** Ниркова колька
- D.** Цистит
- E.** Ниркова недостатність

38. До фельдшера ФАПУ на прийом звернувся хворий зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, прогресуючу втрату ваги тіла, профузний нічний піт протягом трьох місяців. Об'єктивно: збільшення лімфатичних вузлів на шиї, у ліктювих згинах, під руками більше 1 см в діаметрі. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** ВІЛ-інфекція
- B.** Чума
- C.** Грип
- D.** Бешиха
- E.** ХТІ

39. Пацієнтка 19-ти років скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болючість при сечовипусканні. Об'єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка:

- A.** Задне склепіння піхви
- B.** Анальний отвір
- C.** Уретра
- D.** Цервікальний канал
- E.** Бічне склепіння піхви

40. Чоловік 48-ми років звернувся до фельдшера здоровпункту промислового підприємства з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у

голові, загальну слабкість. Об'єктивно: АТ- 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

- A.** Артеріальна гіпертензія
- B.** Артеріальна гіпотензія
- C.** Гіпертермія
- D.** Тахікардія
- E.** Брадикардія

41. Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64-х років з матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку з'явилися серозно-водянисті виділення з піхви, які потім стали серозно-кров'янисті, типу "м'ясних помий", з'явився біль внизу живота. Яка патологія найбільш імовірна?

- A.** Рак матки
- B.** Неповний аборт
- C.** Міхуровий занесок
- D.** Хоріонепітеліома
- E.** Внутрішній ендометріоз

42. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 22-х років зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 39,5°C. Об'єктивно: ЧСС- 108/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий у гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в гіпогастрії. Піхвове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, задне склепіння піхви нависає, різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Пельвіоперитоніт
- B.** Гострий аднексит
- C.** Гострий ендометрит
- D.** Позаматкова вагітність
- E.** Апоплексія яєчника

43. Хлопчик 12-ти років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: виразкова хвороба шлунка. Хворіє близько 2-х років. Тиждень тому загальний стан дитини погіршився, був госпіталізований. Яке дієтичне харчування повинна одержувати дитина?

- A.** № 1a
- B.** № 7
- C.** № 9
- D.** № 5
- E.** № 15

44. Фельдшер ФАПУ викликаний до дитини 8-ми місяців. Зі слів мами дитина раптово знепритомніла, наступила зупинка дихання, дитина посиніла, через 1 хвилину з'явився гучний вдих, схожий на півнячий крик. З анамнезу: дитина з 1-го місяця на штучному вигодовуванні. Голову тримає з 3-х місяців, зубів немає, самостійно не сидить. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A.** Гіпокальціємічний синдром, ларингоспазм
- B.** Стенозуючий ларинготрахеїт
- C.** Гіпокальціємічний синдром, карпопедальний спазм
- D.** Напад бронхіальної астми
- E.** Гіпокальціємічний синдром, еклампсія

45. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора 37-ми років зі скаргами на серцебиття, підвищену дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,0-37,5°C, пронос, схуднення. В анамнезі часті нервові перенапруження впродовж 3-х років. Об'єктивно: зниженого харчування. Шкіра волога, тремор пальців рук. Позитивні очні симптоми. Щитоподібна залоза збільшена. Тахікардія, тони серця звучні. Рс- 110/хв., АТ- 160/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Дифузний токсичний зоб
- B.** Гіпертонічна хвороба
- C.** Гіпотиреоз
- D.** Ендемічний зоб
- E.** Хвороба Іценка-Кушинга

46. Виклик ШМД до хворого 62-х років, який скаржиться на раптовий напад інтенсивного стискаючого, пекучого за груднинного болю, з характерною іррадіацією. Біль виник під час фізичного навантаження, триває більше 6 хв. Об'єктивно: блідість шкіри та ціаноз губ, холодні кінцівки. Тони серця приглушені, поодинокі екстрасистоли. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

- A.** Нітрогліцерин 1-2 таблетки під язик
- B.** Анальгін по 0,5 г 3 рази на добу
- C.** Верапаміл 0,08 - 1 таблетка 4 рази на добу
- D.** Корвалол по 15-30 крапель 2-3 рази на добу
- E.** Діазепам 0,005 г - 1 таблетка 2 рази на добу

47. Жінку 40-ка років збила машина. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Жінці ввели протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?

- A.** На твердих ношах у положенні "жаби"
- B.** За допомогою шини Дітерікса
- C.** За допомогою шини Белера
- D.** На твердих ношах на животі
- E.** На ношах, під шию покласти валик

48. Хворий скаржиться на різку болючість у правій здухвинній ділянці. Об'єктивно: температура тіла 37,2°C, нудота, блювання. Позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Виразкова хвороба
- D.** Гострий панкреатит
- E.** Гострий пієлонефрит

49. Дитина фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку лежачи на животі, видає незначні звуки (агукає), посміхається, спить близько 20 годин на добу. Якому віку відповідає нервово-психічний розвиток дитини?

- A.** 1-2 місяці
- B.** 7-8 місяців
- C.** 5-6 місяців
- D.** 4-5 місяців
- E.** 4-6 місяців

50. При заборі крові на ФАПі хворий знепритомнів. Яке положення повинен надати фельдшер хворому?

- A.** Лежачи з трохи піднятими ногами
- B.** Напівлежачи в ліжку
- C.** Лежачи на животі
- D.** Лежачи на боці
- E.** Сидячи в кріслі

51. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПУ на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Алергічний діатез
- B.** Анемія
- C.** Гіпотрофія
- D.** Рахіт
- E.** Пітниця

52. У хворої 68-ми років відмічається виділення великої кількості харкотиння (більше 300 мл) "повним ротом", з неприємним запахом. Про яке захворювання можна подумати?

- A.** Абсцес легень
- B.** Інфаркт легені
- C.** Рак легені
- D.** Бронхіальна астма
- E.** Крупозна пневмонія

53. У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підбер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Об'єктивно: Рс- 100/хв., аритмічний, екстрасистолія. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз - $13,8 \cdot 10^9$ /л. ЕКГ - інтервал *ST* у відведеннях III та aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- A.** Гострий інфаркт міокарда
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий холецистит
- D.** Перфорація виразки шлунка
- E.** Харчова токсикоінфекція

54. Дитині 6 місяців. Маса тіла 7400 г, отримує материнське молоко. Який продукт необхідно призначити для першого підгодовування?

- A.** Овочеve пюре
- B.** Молочна каша
- C.** М'ясний фарш
- D.** Сир
- E.** Кефір

55. На III етапі реабілітації пацієнтові з діагнозом хронічний поліартрит призначено радонові ванни. Якою повинна бути тривалість цієї процедури?

- A.** 10-15 хв.
- B.** 5 хв.
- C.** 3-7хв.
- D.** 20-25хв.
- E.** 30 хв.

56. На здоровпункті хімічного заводу проводиться забір донорської крові. Чоловік 24-х років раптово зблід і знепритомнів. Зіниці вузькі, реагують на світло, кінцівки холодні. ЧСС- 55/хв. Діагноз: гостра судинна недостатність (непритомність). Яка невідкладна допомога?

- A.** Горизонтальне положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту
- B.** Напівсидяче положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту
- C.** Сидяче положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту
- D.** Горизонтальне положення, адреналін в/м
- E.** Горизонтальне положення, ефедрин в/м

57. З метою реалізації державної науково-технічної програми "Атеросклероз", фельдшер здоровпункту хлібозаводу проводить бесіду із робітниками. Яку пораду дасть фельдшер?

- A.** Перевіряти рівень холестерину в крові щороку
- B.** Перевіряти рівень цукру в крові щороку
- C.** Перевіряти рівень креатиніну в крові щороку
- D.** Уникати переохолодження
- E.** Уникати емоційного перенапруження

58. До фельдшера ФАПУ звернулася вагітна 26-27 тижнів з набряками гомілок та передньої черевної стінки. АТ- 160/105 мм рт.ст., протеїнурія - 0,1 г/л. Який найбільш імовірний ді-

агноз?

- A.** Прееклампсія II ступеня
- B.** Протеїнурія
- C.** Нефропатія II ступеня
- D.** Гіпертонічна хвороба
- E.** Еклампсія

59. У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії фельдшера?

- A.** Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду
- B.** Ввести еуфілін
- C.** Ввести 20% розчин кофеїну
- D.** Покласти грілку
- E.** Ввести строфантин

60. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржитись на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка більш поширена у природних складках; носо-губний трикутник блідий. Про яке захворювання може подумати фельдшер?

- A.** Скарлатина
- B.** Менінгококова інфекція
- C.** Кір
- D.** Краснуха
- E.** Вітряна віспа

61. У дитини 6-ти років при огляді шкіри фельдшер виявила папули та однокамерні везикули на всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинен застосувати фельдшер?

- A.** 1% спиртовий розчин діамантового зеленого
- B.** 50% розчин анальгіну
- C.** 5% розчин йоду
- D.** 30% розчин сульфацилу натрію
- E.** 1% розчин димедролу

62. Бригада швидкої допомоги викликана до пацієнта 20-ти років, у якого після вживання несвіжих котлет з'явилися болі в епігастрії, блювання, пронос, підвищилась температура тіла до 37,8°C. Які дії фельдшера?

- A.** Промивання шлунка, транспортування до інфекційного відділення
- B.** Призначення антибіотиків
- C.** Введення спазмолітиків
- D.** Виклик терапевта додому
- E.** Транспортування до терапевтичного відділення

63. Фельдшер ФАПУ дає рекомендації по дієтичному харчуванню пацієнтці 54-х років, що страждає на цукровий діабет. Який стіл застосовують при лікуванні цукрового діабету?

- A.** № 9
- B.** № 5
- C.** № 7
- D.** № 10
- E.** № 15

64. Хвора 24-х років відзначає відсутність менструації після медичного абортів протягом 3-х місяців, раніше менструальна функція не порушувалася, гінекологічних захворювань немає. Під час огляду матка і додатки без особливостей. Про яку патологію йдеться?

- A.** Аменорея (маткова форма)
- B.** Аменорея (яєчникова форма)
- C.** Синдром Шихана
- D.** Синдром склерокістозних яєчників
- E.** Ендометріоз

65. Фельдшер швидкої допомоги на виклику у жінки 65-ти років з масивною кровотечею з піхви. В анамнезі - рак шийки матки. Яка тактика фельдшера?

- A.** Провести тугу тампонаду піхви
- B.** Ввести кровоспинні засоби
- C.** Ввести скорочуючі засоби
- D.** Ввести анальгетики
- E.** Покласти холод на низ живота

66. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржитись на кашель вранці з виділенням гнійного харкотиння з неприємним запахом (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37,8°C. При огляді пальці мають ви-

гляд "барабанних паличок", а нігті "годинникових скелець". Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- A.** Бронхоектатична хвороба
- B.** Пневмонія
- C.** Туберкульоз
- D.** Плеврит
- E.** Пневмоконіоз

67. Фельдшера здоровпункту викликали до пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки зі скаргами на блювання "кавовою гущею" на тлі посиленого болю. Об'єктивно: на чолі краплини поту. Рс-130/хв., АТ- 70/50 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий під час пальпації у надчревній ділянці. Що слід використати для надання невідкладної допомоги?

- A.** Натрію етамзилат
- B.** Папаверин
- C.** Анальгін
- D.** Солкосерил
- E.** Церукал

68. Фельдшер швидкої допомоги оглядає дівчинку 5-ти років. Півгодини тому дівчинку вжалила оса в ділянку шиї. Стан дитини під час огляду вкрай важкий: свідомість пригнічена, дихання поверхневе, ознаки прогресуючого брадикардного та брадикардії. АТ- 60/40 мм рт.ст. Препаратом вибору для надання невідкладної допомоги буде:

- A.** 0,1% адреналін
- B.** 0,06% корглікон
- C.** 1% димедрол
- D.** 20% натрію оксибутират
- E.** 50% анальгін

69. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на біль у грудях, задишку. З анамнезу: багато років страждає на варикозне розширення вен, двічі був тромбофлебіт. Стан погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну смерть і припустив, що причина її:

- A.** Тромбоемболія легеневої артерії
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Спонтанний пневмоторакс
- D.** Травма грудної клітки
- E.** Фібриляція шлуночків

70. У сімейну амбулаторію звернулася пацієнтка 50-ти років, яка впродовж декількох років страждає на цукровий діабет. Лікар призначив хворій підшкірне введення інсуліну в кількості 16 МО (1 мл інсуліну = 40 МО). Яку кількість інсуліну треба ввести пацієнтці?

- A.** 0,4 мл
- B.** 0,9 мл
- C.** 0,3 мл
- D.** 0,6 мл
- E.** 0,7 мл

71. Хвора 28-ми років знаходиться на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми. 1-2 рази на місяць спостерігаються напади ядухи з експираторною задишкою, сухим кашлем, сльозотечею, нежиттю. Напад закінчується відходженням в'язкого склоподібного мокротиння. Які засоби необхідно призначити для профілактики нападів?

- A.** Інгаляції сальбутамолу
- B.** Інгаляції фітонцидів
- C.** Преднізолон внутрішньовенно
- D.** Еуфілін внутрішньовенно
- E.** Преднізолон внутрішньо

72. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D₃:

- A.** З 10-14-го дня по 500-1000 МО
- B.** З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- C.** З 10-го дня по 2000 МО
- D.** На 2-му тижні по 4000 МО
- E.** На 2-му місяці життя по 500 МО

73. Фельдшер ФАПу транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися дорогою, 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?

- А.** Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері
- В.** Спостерігати за новонародженим
- С.** Виміряти температуру тіла новонародженого
- Д.** Здійснити клеймування пуповини
- Е.** Провести профілактику офтальмії

74. Пацієнт 42-х років поскаржиться на кашель та виділення харкотиння 3 місяці поспіль. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?

- А.** Хронічний бронхіт
- В.** Гострий бронхіт
- С.** Крупозна пневмонія
- Д.** Абсцес легенів
- Е.** Ексудативний плеврит

75. Хворого ввечері і вночі турбував сильний свербіж, який супроводжувався появою на шкірі тулуба, шиї, стегон множинних уртикарних висипань. Вранці висипки вже не було. Напередодні хворий вживав у їжу м'ясні консерви. Для якого захворювання характерні вище зазначені симптоми?

- А.** Кропив'янка
- В.** Екзема
- С.** Дерматит
- Д.** Атопічний дерматит
- Е.** Себорейний дерматит

76. Фельдшер здоровпункту швейної фабрики провів бесіду з робітницями стосовно профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози. Як часто повинна жінка проводити самообстеження молочних залоз?

- А.** 1 раз в місяць
- В.** 1 раз в тиждень
- С.** Кожного дня
- Д.** 1 раз на рік
- Е.** 1 раз у 3 місяці

77. Хвора 21-го року звернулась до фельдшера здоровпункту зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,3°C, слабкість, пітливість, серцебиття, біль в ділянці серця, почервоніння та набряк колінних суглобів. Два тижні тому перенесла ангіну. Об'єктивно: на гомілках блідо-рожева кільцеподібна висипка. АТ-110/70 мм рт.ст. Ліва межа серця на 0,5 см назовні від лівої середньоклю-

чичної лінії, на верхівці - м'який систолічний шум. У крові: лейкоцити - $10,2 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ- 35 мм/год. Якою повинна бути вторинна профілактика даного захворювання після проведення курсу лікування у стаціонарі?

- А.** Біцилін-5 впродовж 5-ти років щомісяця
- В.** Біцилін-5 впродовж 3-х років щомісяця
- С.** Біцилін-3 при інтеркурентній інфекції
- Д.** Бензилпеніцилін навесні та восени
- Е.** Аспірин навесні та восени

78. Дитина 10-ти років страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції інсуліну не поїла. На другому уроці раптово з'явилося відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою. З чого слід почати надання допомоги на догоспітальному етапі?

- А.** Дати цукерку, солодкий чай
- В.** Госпіталізувати
- С.** Ввести в/в преднізолон
- Д.** Ввести в/м 25% р-н магнію сульфату
- Е.** Ввести підшкірно 0,1% р-н адреналіну

79. Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив передпліччя на токарному верстаті. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого до лікарні?

- А.** Накласти кровоспинний джгут
- В.** Провести ПХО рани
- С.** Накласти стискаючу пов'язку
- Д.** Накласти міхур з льодом
- Е.** Провести тампонаду рани

80. Вранці при огляді дітей в дитячому садку виявили у 5-річної дівчинки папульозно-везикулярний висип на волосяній частині голови. Про яке захворювання слід подумати?

- А.** Вітряна віспа
- В.** Менінгококова інфекція
- С.** Скарлатина
- Д.** Кіп
- Е.** Краснуха

81. У пацієнтки 19-ти років гострий бронхіт. Її турбує сухий кашель, тем-

пература тіла $37,2^{\circ}\text{C}$. Яку фізіотерапевтичну процедуру доцільно провести для полегшення стану пацієнтки?

- A.** Застосування гірчичників
- B.** Застосування грілки
- C.** Гірудотерапія
- D.** Оксигенотерапія
- E.** Використання мішура із льодом

82. До фельдшера ФАПу звернулася молода мати зі скаргами на закисання правого ока у дитини віком 1 місяць. Об'єктивно: слизові виділення з ока, слъзостояння та виділення гною через нижню слъзову крапку при натисканні у місці проекції слъзового мішка. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину?

- A.** Дакріоцистит новонароджених
- B.** Бактеріальний кон'юнктивіт
- C.** Блефарит новонароджених
- D.** Аденовірусний кон'юнктивіт
- E.** Ячмінь нижньої повіки

83. Пацієнту 46-ти років із виразковою хворобою шлунка фельдшер призначив ранітидин. До якої групи відноситься цей препарат?

- A.** Блокатори гістамінових H_2 -рецепторів
- B.** β -адреноблокатори
- C.** М-холіноблокатори
- D.** Симпатолітики
- E.** Блокатори протонної помпи

84. У першому періоді пологів роділля скаржить на сильний біль у животі та попереку, тенезми. Перейми сильні, виникають через короткі проміжки, із частотою 6 впродовж 10 хвилин. Що повинен фельдшер ФАПу запропонувати роділлі до прибуття лікаря?

- A.** Лягти на бік, протилежний позиції плоду
- B.** Лягти на спину
- C.** Лягти на бік, що відповідає позиції плоду
- D.** Прийняти вертикальне положення тіла
- E.** Вільне ходіння

85. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, який 15 хвилин тому травмував колінний суглоб без пошкоджен-

ня шкіри. Що слід використати в цьому випадку?

- A.** Холодний компрес
- B.** Гарячий компрес
- C.** Припарка
- D.** Гірудотерапія
- E.** Зігріваючий компрес

86. На ФАП доставлений пацієнт 50-ти років з пупковою грижею, у якого після фізичного навантаження виник раптовий біль у ділянці випинання, збільшення об'єму і напруження грижі, неможливість вправлення грижового вмісту в черевну порожнину. Яка тактика є найбільш доцільною в даному випадку?

- A.** Терміново госпіталізувати в хірургічне відділення
- B.** Спокій
- C.** Надати лежачого положення
- D.** Міхур з льодом на місце випинання
- E.** Обмежити прийом їжі

87. У вагітної 38 тижнів, на фоні різкого головного болю, погіршення зору, підвищення тиску до 180/120 мм рт.ст. і виражених набряків, виник напад судом. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Пізній гестоз - еклампсія
- B.** Пізній гестоз - артеріальна гіпертензія
- C.** Пізній гестоз - протеїнурія
- D.** Пізній гестоз - набряки
- E.** Пізній гестоз - прееклампсія

88. Фельдшер прийшов на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отриманий результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- A.** 1000 г
- B.** 900 г
- C.** 800 г
- D.** 700 г
- E.** 600 г

89. Фельдшеру швидкої допомоги надійшов виклик до хлопчика 4-х років. Об'єктивно: загальний стан порушений, дитина млява, неспокійна, температура тіла $39,7^{\circ}\text{C}$, ЧД- 32/хв., ЧСС- 140/хв. На шкірі спини, сідниць, стегнах, гомілках спостерігаються гемо-

рагічні висипання неправильної "зірчастої" форми з некрозом в центрі. Яку невідкладну допомогу необхідно надати на догоспітальному етапі?

- A.** Ввести левоміцетин, преднізолон, анальгін
- B.** Ввести супрастин, парацетамол, цефтріаксон
- C.** Ввести анальгін, димедрол, дексаметазон
- D.** Ввести сибазон, лазикс, парацетамол
- E.** Ввести піпольфен, бензилпеніцилін, строфантин

90. До ФАПу доставлений потерпілий 27-ми років після травми живота. Скарги на біль у животі, припинення виділення сечі, здуття живота. При пальпації живота відмічається напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. У черевній порожнині наявна рідина, яка переміщується при зміні положення хворого. З чим пов'язана проблема пацієнта?

- A.** Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура
- B.** Позачеревне ушкодження сечового міхура
- C.** Гострий апендицит
- D.** Гострий пієліт
- E.** Гострий цистит

91. До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргами на біль у суглобах кистей рук, "ранкову скутість". Об'єктивно: припухлість суглобів кистей рук, деформація їх у вигляді "ластів моржа". Яке дослідження треба зробити для уточнення діагнозу?

- A.** Рентгенографія суглобів
- B.** ЕКГ
- C.** Клінічний аналіз сечі
- D.** Клінічний аналіз крові
- E.** УЗД

92. Вдома у хлопчика 10-ти місяців, на тлі рахіту, при довготривалому плачі виникла зупинка дихання. Незабаром дихання спонтанно відновилося. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Спазмофілія. Ларингоспазм
- B.** Спазмофілія. Карпопедальний спазм
- C.** Спазмофілія. Еклампсія
- D.** Гіпервітаміноз D
- E.** Повець

93. Хвора 43-х років скаржиться на контактні піхвові кровотечі впродовж останніх 6-ти місяців. Бімануально: шийка матки збільшена у розмірі, обмежена у рухливості. У дзеркалах - шийка матки у вигляді "цвітної капусти". Проби Хробака та Шиллера - позитивні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Рак шийки матки
- B.** Поліп шийки матки
- C.** Шийкова вагітність
- D.** Фіброїд, що народжується
- E.** Лейкоплакія

94. До фельдшера звернулася жінка 40-ка років із скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, переймоподібні болі в нижніх відділах живота, мізерні випорожнення більше 10 разів із слизом та кров'ю, тенезми. Хворіє другий день. Об'єктивно: температура 38°C, язик обкладений білим нальотом. Пальпується спазмована болюча сигмоподібна кишка. Який діагноз запідозрить фельдшер?

- A.** Шигельоз
- B.** Сальмонельоз
- C.** Ешерихіоз
- D.** Ієрсиніоз
- E.** Диспепсія

95. До ФАПу звернулася пацієнтка 28-ми років, якій призначено напівспиртовий зігрівальний компрес на ліктьовий суглоб. На який час необхідно накласти компрес?

- A.** 6-8 годин
- B.** 10-12 годин
- C.** 4-5 годин
- D.** 2-3 години
- E.** 1 година

96. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 29-ти років, який в зв'язку із загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. Раптово підвищилась температура тіла, з'явився біль у суглобах, животі, на шкірі з'явилась геморагічна висипка з хара-

ктерним симетричним розташуванням елементів, особливо на нижніх кінцівках. Відзначає червоний колір сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Геморагічний васкуліт
- B.** Гострий цистит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Гострий гломерулонефрит
- E.** Амілоїдоз нирок

97. Фельдшер ФАПу спостерігає за осередком туберкульозної інфекції. Дитині 10-ти років проведена туберкулінова проба Манту. Які результати свідчать про позитивну пробу у дитини?

- A.** Папула 6 мм
- B.** Папула 20 мм
- C.** Гіперемія 5 мм
- D.** Папула 3 мм
- E.** Гіперемія 10 мм

98. До ФАПу звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні пацієнта спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров'янистим вмістом. Який це ступінь відмороження?

- A.** III
- B.** I
- C.** II
- D.** III б
- E.** IV

99. На ФАПі дитині 5-ти місяців зроблено щеплення вакциною "пентаксим". Стан дитини різко погіршився. На шкірі з'явилася кропив'янка, пульс слабкий, артеріальний тиск падає. Який препарат фельдшер буде вводити в першу чергу?

- A.** 0,1% розчин адреналіну
- B.** 2,4% розчин еуфіліну
- C.** 3% розчин преднізолону
- D.** 2% розчин супрастину
- E.** 10% розчин глюконату кальцію

100. До ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. Об'єктивно: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Визначити подальшу тактику фельдшера:

- A.** Направити до дільничного гінеколога
- B.** Направити на УЗД
- C.** Направити до відділення патології вагітності
- D.** Направити в гінекологічне відділення
- E.** Направити до терапевта

101. До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль в ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ФАПу. Об'єктивно: збудження, червоні плями на обличчі, шиї, Рс- 110/хв, АТ- 180/110 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- A.** Гіпертонічний криз I типу
- B.** Гіпертонічний криз II типу
- C.** Харчове отруєння
- D.** Інфаркт міокарда
- E.** Напад стенокардії

102. Фельдшер ФАПу, прибулий на місце події, діагностував у потерпілого 28-ми років відкритий перелом кісток тазу з ушкодженням сечового міхура. З чого слід почати невідкладну допомогу?

- A.** Катетеризація сечового міхура
- B.** Введення знеболюючих засобів
- C.** Транспортна іммобілізація
- D.** Проведення туалету рани
- E.** Накладання асептичної пов'язки

103. У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламане на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

- A.** Мікроспорія
- B.** Поверхнева трихофітія
- C.** Парша
- D.** Псоріаз
- E.** Себорейна екзема

104. Хворий 23-х років поскаржився фельдшеру ФАПу на спрагу, слабкість, схуднення, апатію, сонливість, втрату апетиту. В останні дні з'явився свербіж шкіри, запах ацетону з рота. Яке додаткове дослідження допоможе встановити діагноз?

- A.** Аналіз крові на цукор натще
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Загальний аналіз сечі
- D.** Аналіз калу на яйця глистів
- E.** Глюкозо-толерантний тест

105. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, якому багаторазово вводили внутрішньовенно ліки. Скаржиться на біль, гіперемію, наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?

- A.** Флебїт
- B.** Гематома
- C.** Інфільтрат
- D.** Сепсис
- E.** Некроз

106. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- A.** Лімфаденїт
- B.** Флегмона
- C.** Бешиха
- D.** Лімфангоїт
- E.** Правець

107. Фельдшера викликали до хворого на бронхіальну астму, у якого вчора почався напад експіраторної задишки. Стан тяжкий. Застосування інгаляторів не дає полегшення. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Астматичний стан
- B.** Крупозна пневмонія
- C.** Гострий бронхіт
- D.** Емфізема легень
- E.** Серцева астма

108. Під час активного патронажу дівчинки 12-ти місяців мати звернулася із запитанням до фельдшера ФАПу: "Скільки зубів повинно бути у її дитини"? Дайте відповідь:

- A.** 8
- B.** 12
- C.** 6
- D.** 13
- E.** 4

109. До фельдшера ФАПу звернулася

жінка 60-ти років зі скаргами на маткову кровотечу після 10-ти років менопаузи. На який додатковий метод дослідження слід направити жінку для уточнення діагнозу?

- A.** Діагностичне вишкрібання матки
- B.** Біопсія шийки матки
- C.** УЗД
- D.** Пункція черевної порожнини
- E.** Кольпоскопія шийки матки

110. Хвора скаржиться на біль, почервоніння в ділянці лівої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,2°C. В ділянці лівої гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Бешиха
- B.** Фурункульоз
- C.** Лімфангоїт
- D.** Гострий тромбофлебіт
- E.** Флегмона

111. Фельдшер швидкої медичної допомоги за призначенням лікаря ввів пацієнту в/в струменево 25% розчин магнію сульфату. Під час венепункції була здійснена наскрізна перфорація вени. Вкажіть можливе ускладнення:

- A.** Гематома
- B.** Інфільтрат
- C.** Некроз
- D.** Тромбофлебіт
- E.** Повітряна емболія

112. Фельдшер ШМД бере участь у проведенні непрямого масажу серця дитині 2-х років. Виконує поштовхоподібні натискування на груднину для компресії серця між грудниною та хребтом. Вкажіть, на яку глибину потрібно проводити натискання груднини цій дитині?

- A.** 1,5 - 2 см
- B.** 2 - 2,5 см
- C.** 2,5 - 3 см
- D.** 3 - 3,5 см
- E.** 3,5 - 4 см

113. Мати з дитиною 5-ти місяців на прийомі у фельдшера ФАПу. Проведена антропометрія. Дефіцит маси тіла 16%. Підшкірна основа збережена

на обличчі та кінцівках. Товщина підшкірної основи в ділянці пупочного кільця складає 0,8 см. Тургор та еластичність шкіри знижені. Сон і апетит незначно порушені. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гіпотрофія I ст.
- B.** Гіпотрофія II ст.
- C.** Гіпотрофія III ст.
- D.** Паратрофія
- E.** Нормотрофія

114. Фельдшера ШМД викликали до пацієнта 44-х років, який скаржиться на появу раптового відчуття болю у животі, який він характеризує, як удар ножем. В анамнезі: виразкова хвороба. Об'єктивно: обличчя бліде, на чолі - холодний піт. Живіт дещо втягнутий. Під час пальпації: передня черевна стінка різко напружена, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Перфоративна виразка
- B.** Печінкова коліка
- C.** Шлункова кровотеча
- D.** Стеноз воротаря
- E.** Гострий панкреатит

115. У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задишка, виділення рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: над легеньми вислуховуються дрібно- та середньопухирчасті вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Гостра лівошлуночкова недостатність
- B.** Гостра судинна недостатність
- C.** Гостра дихальна недостатність
- D.** Легенева кровотеча
- E.** Шлунково-кишкова кровотеча

116. До фельдшера ФАПУ на чергову явку звернулася вагітна в терміні 34 тижні. Який документ обов'язково повинна мати при собі вагітна?

- A.** Обмінна карта
- B.** Паспорт
- C.** Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- D.** Довідка про вагітність
- E.** Результати обстеження на ВІЛ/СНІД

117. На сьомий день життя в новонародженої дитини після сечовипускання на памперсі залишилися плями жовтувато-цегляного кольору. Загальний стан дитини задовільний. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Сечокислий інфаркт нирок
- B.** Транзиторна гарячка
- C.** Транзиторний катар кишечника
- D.** Токсична еритема
- E.** Статевий криз

118. До фельдшера здоров'я звернулася пацієнтка 46-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, з проханням ввести їй інсулін. Яку пораду фельдшер повинен дати хворій після ін'єкції інсуліну?

- A.** Прийняти їжу
- B.** Лужне пиття
- C.** Випити відвар шипшини
- D.** Спокій
- E.** Прийняти заспокійливе

119. До ФАПУ звернулася жінка 50-ти років, у якої після вживання смаженої їжі та алкоголю з'явився сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, що супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням, яке не приносить полегшення. Симптоматика якого захворювання спостерігається?

- A.** Гострий панкреатит
- B.** Гострий холецистит
- C.** Виразкова хвороба шлунка
- D.** Ентероколіт
- E.** Виразковий езофагіт

120. Фельдшер ШМД з лікарем приймального покою визначає групу крові хворого за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Аглютинація не відбулась. Яка група крові у пацієнта?

- A.** 0 (I)
- B.** A (II)
- C.** B (III)
- D.** AB (IV)
- E.** Помилка при визначенні

121. У жінки 25 років маткова кровотеча нез'ясованого походження. АТ-90/50 мм рт.ст. Який перший захід невідкладної долікарської допомоги треба провести під час транспортування хворої до стаціонару?

- A.** Покласти холод на низ живота
- B.** Ввести хлористий кальцій
- C.** Мобілізувати вену для інфузії кровозамінників
- D.** Ввести кровоспинні засоби
- E.** Ввести скорочуючі матку засоби

122. Фельдшера ШМД викликали на пологи, що відбулися на дому. Роділля народила живого доношеного хлопчика масою 4000 г. Плацента виділилася самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововтрата у пологах близько 200 мл. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згортками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?

- A.** Гіпотонічна маткова кровотеча
- B.** Атонічна маткова кровотеча
- C.** Розрив матки
- D.** Розрив шийки матки
- E.** Кровотеча у зв'язку з порушенням зсідання крові

123. Оберіть еубіотики для лікування дисбактеріозу у дитини, хворої на ексудативно-катаральний діатез:

- A.** Біфікол, лактобактерин
- B.** Тазапам, сибазон
- C.** Кларитин, тавегіл
- D.** Тималін, тимазин
- E.** Ессенціале, карсил

124. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на почервоніння шкіри обличчя та сильний свербіж. Дані скарги з'явилися 12 годин тому, після використання косметичної маски. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Дерматит
- B.** Екзема
- C.** Токсикодермія
- D.** Нейродерміт
- E.** Псоріаз

125. Фельдшер ФАПу отримав виклик до пацієнта, у якого розвинулась гіпоглікемічна кома. Який препарат є препаратом вибору для надання невідкладної допомоги?

- A.** 40% розчин глюкози
- B.** Інсулін
- C.** Астмопент
- D.** Кордіамін
- E.** Мезатон

126. Фельдшера здоровпункту викликали до слюсаря, який щойно отримав травму лівої кисті на токарному верстаті. Об'єктивно: на долоні лівої кисті рвана рана 3x5 см, сильно кровоточить. Який першочерговий захід треба виконати в даному випадку?

- A.** Накласти джгут на плече
- B.** Накласти джгут на передпліччя
- C.** Прикласти холод
- D.** Ампутувати кисть
- E.** Обробити антисептиком

127. Хворий 27-ми років, який упав на витягнуту праву верхню кінцівку, скаржить на біль і неможливість активних рухів та різке обмеження пасивних рухів у правому плечовому суглобі. Об'єктивно: правий плечовий суглоб деформований, його контури згладжені, є параартикулярний набряк. Кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік). Ушкоджене плече довше. На місці головки правого плеча - западина. Яку іммобілізаційну пов'язку слід накласти на ушкоджену кінцівку?

- A.** Шина Крамера
- B.** Кільця Дельбе
- C.** Шина Дітерікса
- D.** Пращеподібна пов'язка
- E.** Восьмиподібна пов'язка

128. Дитина стала дратівливою, млявою, швидко втомлюється, втрачає апетит, худне, температура субфебрильна, реакція Манту з 2 ТО - 8 мм. Для клініки якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Рання туберкульозна інтоксикація
- B.** Аденовірусна інфекція
- C.** Позалікарняна пневмонія
- D.** Грип
- E.** Ревматична лихоманка

129. У роділлі яка народжує вдруге, наприкінці I періоду пологів після відходження навколоплідних вод виникли ядуха, кашель, біль за грудниною, страх. Надайте допомогу:

- A.** Накладання акушерських щипців
- B.** Кесарів розтин
- C.** Епізіотомія
- D.** Перінеотомія
- E.** Краніотомія

130. Скільки разів на день та впродовж якого часу проводиться кварцування та провітрювання перев'язувального кабінету хірургічного відділення?

- A.** 4 рази на день по 15-20 хвилин
- B.** 1 раз на день по 5-10 хвилин
- C.** 3 рази на день по 15-20 хвилин
- D.** 3 рази на день по 5-10 хвилин
- E.** 2 рази на день по 15-20 хвилин

131. Хвора скаржиться на часте і болісне сечовипускання. Захворіла гостро, захворювання пов'язує з переохолодженням. У сечі: лейкоцити, білок, поодинокі еритроцити. Що можна запідозрити у хворої?

- A.** Гострий цистит
- B.** Гострий пієлонефрит
- C.** Сечокам'яна хвороба
- D.** Піонефроз
- E.** Гідронефроз

132. Пацієнт 60-ти років з цирозом печінки висловлює скарги на слабкість, холодний піт, запаморочення, випорожнення чорного кольору. Вдома короткочасно знепритомнів. Об'єктивно: Рс- 102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Кровотеча з розширених вен стравоходу
- B.** Виразка дванадцятипалої кишки, що кровоточить
- C.** Пухлина шлунку
- D.** Кровотеча з пухлини легенів у фазі розпаду
- E.** Пухлина товстої кишки

133. На ФАП надійшов пацієнт 20-ти років, який отримав удар у нижню щелепу, зі скаргами на біль при відкриванні рота, рясне слиновиділення з домішкою крові. Об'єктивно: прикус порушений. Під час пальпації та перкусії - болісність кута нижньої щелепи, набряклість м'яких тканин, обмеження рухів. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Відкритий перелом нижньої щелепи
- B.** Закритий перелом нижньої щелепи
- C.** Вивих нижньої щелепи
- D.** Підвивих нижньої щелепи
- E.** Забій м'яких тканин ділянки нижньої щелепи

134. На ФАП звернувся пацієнт, прооперований у хірургічному відділенні місяць тому з приводу перфоративної виразки 12-палої кишки. Скарги на різкі нападоподібні болі у животі, які тривають близько години, багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт під час нападу. Живіт м'який, болісний у всіх відділах. Стулу не було. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- A.** Спайкова кишкова непрохідність
- B.** Абсцес черевної порожнини
- C.** Метеоризм
- D.** Рецидив виразкової хвороби 12-палої кишки
- E.** Перитоніт

135. Фельдшера ШМД викликали до хворого, який знаходиться у вкрай важкому стані. Скарги на пронос і блювання протягом 2-х днів. Випорожнення по типу "рисового відвару". Об'єктивно: риси обличчя загострені, очі запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки. Температура 35,5°C, пульс ниткоподібний. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Холера
- B.** Дизентерія
- C.** Харчова токсикоінфекція
- D.** Сальмонельоз
- E.** Колі-ентерит

136. Дитині 10 днів. Періодично відмічається зригування після годування грудьми. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

- А.** Слабкість кардіального сфінктера шлунку
- В.** Підвищена секреторна активність шлунку
- С.** Довга, пухка брижа
- Д.** Знижена секреторна активність шлунку
- Е.** Підвищена перистальтика шлунку

137. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 39-ти років зі скаргами на свербіж шкіри, який з'явився одночасно з висипкою і значно посилюється увечері та вночі. З анамнезу: 10 днів тому прибув з відрядження, де проживав у гуртожитку. Об'єктивно: на шкірі живота, сідниць, променево-зап'ясткових суглобів та бокових поверхонь пальців рук - парні папуло-везикулярна висипка із кров'яними кірочкам. Який попередній діагноз?

- А.** Короста
- В.** Екзема
- С.** Кропив'янка
- Д.** Токсикодермія
- Е.** Пруриго

138. До фельдшера ФАПу звернувся постраждалий на 4 добу після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна. Стан постраждалого раптово став погіршуватись. Скарги на розпираючий біль у рані в середній третині стегна. Біль посилюється за останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла $38,2^{\circ}\text{C}$, $\text{Ps}- 102/\text{хв}$. Краї рани зяють, тьмяні, м'язи вибухають у рані, при захваті пінцетом тканини розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані?

- А.** Анаеробна інфекція
- В.** Аеробна грамнегативна інфекція
- С.** Гнильна інфекція
- Д.** Аеробна грампозитивна інфекція
- Е.** Дифтерія рани

139. Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C , слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті та болісні сечовипускання, нетримання сечі. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

- А.** УЗД нирок
- В.** Рентгеноурологічне
- С.** Екскреторна урографія
- Д.** Цистоскопія
- Е.** Мікційна цистографія

140. На ФАП звернувся хворий 42-х років зі скаргами на гарячку до 39°C , біль у правій половині грудної клітки, який посилюється під час глибокого дихання, кашлю (кашель з виділенням "іржавого" харкотиння), виражену кволість, пітливість. У крові: лейкоцитоз - $15,2 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 37 мм/год. Яке захворювання можна запідозрити?

- А.** Крупозна пневмонія
- В.** Плеврит
- С.** Бронхоектатична хвороба
- Д.** Абсцес легень
- Е.** Вогнищева пневмонія

141. Після ДТП у потерпілого з носа, носоглотки і вух витікає спинномозкова рідина, позитивний симптом окулярів. Яке ушкодження потрібно запідозрити у хворого?

- А.** Перелом основи черепа
- В.** Струс мозку
- С.** Забій мозку
- Д.** Стиснення мозку
- Е.** Перелом склепіння черепа

142. На ФАП доставлений хворий зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. Діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який патогенетичний антидот найдоцільніше застосувати?

- А.** Розчин атропіну сульфату 0,1%
- В.** Розчин унітіолу 5%
- С.** Розчин тіосульфату 20%
- Д.** Антидот Стрижевського
- Е.** Розчин натрію гідрокарбонату 3%

143. Пацієнт скаржиться на виражений біль та порушення функції вказівного пальця лівої кисті. Захворів 4 дні назад після того, як проколов палець кісткою під час чищення риби. За допомогою не звертався. Біль постійно наростав, а останню ніч позбавив хворого сну. При огляді лівий вказівний палець набряклий, гарячий на дотик, гіперемований, болючий. Яке

лікування доцільно провести хворому?

- A.** Оперативне
- B.** Консервативне
- C.** Фізіотерапевтичне
- D.** Комплексне
- E.** Превентивне

144. Фельдшера викликали на місце ДТП. Нижні кінцівки потерпілого були придавлені перевернутим автомобілем впродовж години. З якого заходу треба починати надавати першу допомогу?

- A.** Введення наркотичних анальгетиків та серцевих засобів
- B.** Транспортна іммобілізація кінцівок
- C.** Накладання асептичних пов'язок на кінцівки
- D.** Обкладання кінцівок льодом
- E.** Туге бинтування еластичними бинтами від периферії до центру

145. Фельдшер ШМД прибув на виклик до вагітної 30-ти років. Вагітність I, 41 тиждень. Яка тактика фельдшера буде найбільш доцільною в даному випадку?

- A.** Госпіталізація вагітної до обсерваційного відділення пологового будинку
- B.** Направити вагітну на планове УЗД
- C.** Направити вагітну до гінекологічного відділення
- D.** Негайне розродження
- E.** Очікувальна тактика фельдшера

146. Хвора на прийомі у фельдшера ФАПу раптово втратила свідомість, впала. З'явилися тонічні судоми, які через 10 секунд змінилися клонічним. Дихання стало хриплим, з рота виділилась піна, відмічається мимовільне сечовипускання. Напад тривав 3 хвилини. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Епілепсія
- B.** Істеричний припадок
- C.** Епістатус
- D.** Шизофренія
- E.** Пухлина скроневої ділянки

147. Під час виклику ШМД пацієнту призначено в/в крапельне введення ліків. Фельдшер повинен пам'ятати, що оптимальна температура інфузій-

ного розчину повинна становити:

- A.** 20-25°C
- B.** 15-20°C
- C.** 20-30°C
- D.** 30-35°C
- E.** 18-20°C

148. Потерпілий отримав ножове поранення грудної клітки. Об'єктивно: стан важкий, АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 100/хв., задишка, ціаноз. У п'ятому міжребер'ї справа по передній поверхні - різана рана розміром 3х2 см., з якої під час видиху виділяється піниста кров. Діагностований відкритий пневмоторакс. Який вид невідкладної допомоги необхідно надати потерпілому на догоспітальному етапі?

- A.** Оклюзійна пов'язка
- B.** Туга тампонада рани
- C.** Кровоспинні препарати
- D.** Спіральна пов'язка
- E.** Киснева подушка

149. Потерпіла 45-ти років була збита автомашиною. Зі слів супроводжуючих, перебувала без свідомості 5-7 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Ps- 92/хв., АТ- 135/85 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Струс головного мозку
- B.** Забій головного мозку
- C.** Перелом основи черепа
- D.** Перелом склепіння черепа
- E.** Здавлення головного мозку

150. Фельдшер на виклику у заміжньої жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- A.** Порушена позаматкова вагітність
- B.** Апоплексія яєчника
- C.** Прогресуюча позаматкова вагітність
- D.** Перекрут ніжки кісти
- E.** Розрив піосальпінкса