

1. У дитини 2-х років температура 38°C , кволість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Ці симптоми свідчать про наявність у дитини такого захворювання:

- А. Гостра пневмонія
- В. Гострий ларингіт
- С. Назофарингіт
- Д. Бронхіальна астма
- Е. Гострий бронхіт

2. Хворий 41-го року зловживає алкоголем близько 7-ми років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити мух та павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який стан розвинувся у хворого?

- А. Алкогольний делірій
- В. Маніакально-депресивний психоз
- С. Старечий параноїд
- Д. Шизофренія
- Е. Епілептичний психоз

3. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік, який скаржиться на загальну слабкість, безсоння, схуднення, гемороїдальні кровотечі. Шкіра жовтянича. На шкірі живота "голова медузи". Асцит. На ногах набряки. Добовий діурез - 500 мл. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- А. Цироз печінки
- В. Хронічний гепатит
- С. Хронічний панкреатит
- Д. Хронічний ентерит
- Е. Хронічний холецистит

4. До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунка. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

- А. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні
- В. УЗД черевної порожнини
- С. Григоскопія
- Д. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка з контрастом
- Е. Реографія

5. Яке із захворювань прямої кишки відноситься до передракових станів і підлягає обов'язковому диспансерному спостереженню та лікуванню?

- А. Поліп прямої кишки
- В. Тріщини прямої кишки
- С. Геморой
- Д. Нориця
- Е. Стриктури анального отвору

6. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків м'якого засобу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства здійснює за допомогою такого методу:

- А. Фенолфталеїновий
- В. Амідопіриновий
- С. Ортотулоїдиновий
- Д. Бензидиновий
- Е. Азопірамовий

7. На виробництві робітник отримав рану грудної клітки. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, різкий біль в місці ушкодження, задишку, кашель. Об'єктивно: шкірні покрови бліді, АТ- 70/60 мм рт.ст. В ділянці рани чути хлюпотіння. Про наявність якого невідкладного стану свідчать ці ознаки?

- А. Відкритий пневмоторакс
- В. Перелом ребер
- С. Набряк легенів
- Д. Кардіогенний шок
- Е. Закритий пневмоторакс

8. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 1 місяць. Мати скаржиться на зникнення грудного молока. Дитину необхідно перевести на штучне вигодовування. Маса тіла при народженні 2900 гр. Вкажіть добову кількість молока (за об'ємним методом):

- A.** 700 мл
- B.** 500 мл
- C.** 650 мл
- D.** 600 мл
- E.** 750 мл

9. Каретою швидкої допомоги доставлена у пологовий будинок родільця 40 тижнів. Пологової діяльності немає. Дві години тому почалася значна кровотеча, яка продовжується дотепер. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття на 1 см; внутрішній зів повністю закритий губчастою тканиною, значна кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Центральне передлежання плаценти
- B.** Бічне передлежання плаценти
- C.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D.** Шийкова вагітність
- E.** Гіпотонічна кровотеча

10. Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників, їх товариш, який працював з електричним обладнанням, крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. Об'єктивно: затиснутий в руці оголений електричний провід, що звисає зі станка. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера:

- A.** Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B.** Дати вдихнути нашатирний спирт
- C.** Ввести протигістамінні препарати
- D.** Знеболити, транспортувати до хірургічного відділення
- E.** Дефібриляція

11. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий під час пальпації. Положення плоду поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене 16/хв. Яке ускладнення виникло у пологах?

- A.** Загроза розриву матки
- B.** Повний розрив матки
- C.** Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D.** Розрив промежини
- E.** Центральне передлежання плаценти

12. У хворої 50-ти років із раком шийки матки виникла профузна кровотеча. До хворої викликали фельдшера ФАПу. Яку допомогу потрібно надати?

- A.** Провести тугу тампонаду піхви
- B.** Накласти шов на шийку матки
- C.** Перетиснути черевну аорту
- D.** Ввести но-шпу внутрішньом'язово
- E.** Ввести тампон із ефіром

13. У пацієнта 18-ти років II стадія гарячки. Він збуджений, на щоках рум'янець, марить, температура тіла 40°C, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу потрібно подбати при догляді за хворим?

- A.** Створити індивідуальний пост
- B.** Подати грілку
- C.** Провітрити палату
- D.** Надати горизонтального положення хворому
- E.** Подати міхур з льодом

14. Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипки?

- A.** 1-2% спиртовий розчин діамантового зеленого
- B.** 3% розчин перекису водню
- C.** Дитячий крем
- D.** Переварена вода
- E.** Елементи висипки не обробляють

15. Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнта 67-ми років. Об'єктивно: у пацієнта відсутні рефлекси на зовнішні подразники, спостерігаються розлади функцій органів дихання та серцево-судинної системи. Назвіть стан пацієнта:

- А.** Коматозний
- В.** Ступорозний
- С.** Сопорозний
- Д.** Шоковий
- Е.** Колаптоїдний

16. У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

- А.** Помістити в гарячу ванну
- В.** Помістити в прохолодну ванну
- С.** Провести катетеризацію
- Д.** Поставити гірчичники на гомілки
- Е.** Поставити холодний компрес на гомілки

17. У пацієнта 45-ти років спостерігається ранкова скутість у дрібних суглобах кистей рук. Об'єктивно: суглоби деформовані ("ласти моржа"), шкіра над ними набрякла та гіперемована. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А.** Ревматоїдний артрит
- В.** Деформуючий артроз
- С.** Хвороба Бехтерева
- Д.** Ревматичний артрит
- Е.** Гонорейний артрит

18. До ФАПУ звернувся хворий 55-ти років зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 місяців. Проноси чергуються із закрепамми, незначна кровотеча. В останні дні з'явився біль у промежині. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив горбисте ущільнення, малорухоме під час пальпації. Який попередній діагноз?

- А.** Рак прямої кишки
- В.** Тріщина прямої кишки
- С.** Геморої
- Д.** Поліп прямої кишки
- Е.** Конділома прямої кишки

19. До фельдшера здоровпункту звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. При огляді: шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст. Пульс частий, слабого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен надати фельдшер?

- А.** Покласти холод та госпіталізувати
- В.** Ввести знеболюючі препарати
- С.** Промити шлунок
- Д.** Направити в жіночу консультацію
- Е.** Направити на УЗД

20. До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання у дитини "фонтаном" без домішки жовчі, погану прибавку маси тіла. Блювання з'явилося з 10-го дня після народження, має кислий характер, за об'ємом більше, ніж висмоктує молока дитина. При огляді живота з'являється симптом "піскового годинника". Яке захворювання у дитини?

- А.** Пілоростеноз
- В.** Пілороспазм
- С.** Диспепсія
- Д.** Гострий гастрит
- Е.** Виразкова хвороба

21. Фельдшер проводить спостереження за розвитком здорової дитини та планує профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції слід застосувати вакцину:

- А.** Хіберікс
- В.** Інфанрікс
- С.** Приорікс
- Д.** БЦЖ
- Е.** Імовакс Поліо

22. Пацієнт 48-ми років звернувся зі скаргами на стискаючий біль у ділянці серця, що виникає на тлі фізичного навантаження, оніміння 4-5 пальців лівої руки. На ЕКГ: зміщення сегменту *ST* нижче ізолінії, негативний зубець *T*. Після больового нападу змін на ЕКГ немає. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Стенокардія
- В.** Інфаркт міокарда
- С.** Гостра серцева недостатність
- Д.** Гостра судинна недостатність
- Е.** Стенокардія напруги

23. У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Попрілості III ступеня
- B.** Везикулопустульоз
- C.** Пітниця
- D.** Попрілості I ступеня
- E.** Пухирчатка новонародженого

24. Пацієнту 70-ти років з аденомою передміхурової залози необхідно промивати постійний катетер Померанцева. Який розчин повинен використати фельдшер з метою запобігання висхідної інфекції?

- A.** Фурациліну 1:5000
- B.** 3% перекису водню
- C.** 6% перекису водню
- D.** 0,9% натрію хлориду
- E.** 2% гідрокарбонату натрію

25. В цеху на підприємстві працівник 32-х років 15 хвилин тому поранив ліве передпліччя. З рани фонтаном витікає кров яскраво-червоного кольору. Стан хворого середньої важкості, Рс- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Які першочергові дії фельдшера при наданні невідкладної допомоги?

- A.** Накласти артеріальний джгут Есмарха на нижню третину плеча
- B.** Накласти міхур з льодом на рану
- C.** Лігувати судину в рані
- D.** Накласти тугу стискаючу пов'язку на рану
- E.** Провести тугу тампонаду рани

26. Фельдшер ФАПу проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плоду?

- A.** Зліва на рівні пупка
- B.** Справа на рівні пупка
- C.** Справа нижче пупка
- D.** Зліва нижче пупка
- E.** Справа вище пупка

27. До фельдшера здоров'я підприємства звернулась жінка 45-ти років зі скаргами на кашель із виділенням невеликої кількості слизистогнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,8°C, загальну слабкість. Хворіє впродовж 4-х діб. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Перкуторно - ясний легеневиий звук; аускультативно - вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені.

Рентгенологічно - ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гостра позашпитальна пневмонія
- B.** Гостра шпитальна пневмонія
- C.** Гострий бронхіт
- D.** Хронічний бронхіт
- E.** Бронхоектатична хвороба

28. На ФАП доставлено хворого 45-ти років із скаргами: біль у епігастрії з подальшим переміщенням у праву здухвинну ділянку, нудота, одноразове блювання. Позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга, Сітковського. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий холецистит
- D.** Защемлена грижа
- E.** Гостра кишкова непрохідність

29. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 49-ти років, який скаржиться на підвищення температури тіла, біль у ділянці серця, задишку. Хворіє останні три дні. Захворювання пов'язує з перенесеною 2 тижні тому ангіною. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові чисті. Мигдалики збільшені, пухкі. Тони серця ритмічні. Систолічний шум на верхівці. Який попередній діагноз?

- A.** Гостра ревматична лихоманка
- B.** Міокардит
- C.** Ревмокардит
- D.** Перикардит
- E.** Хронічний тонзиліт, загострення

30. На ФАП звернувся хворий 57-ми років, працює бурильником. Скаржиться на ниючий біль у кистях, який турбує уночі, відчуття "повзання мурашок", мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, зазначає побіління пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Вібраційна хвороба
- B.** Синдром Рейно
- C.** Діабетична полінейропатія
- D.** Реактивний артрит
- E.** Інтоксикаційна полінейропатія

31. Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюру. Об'єктивно: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми?

- A.** Вивих плеча
- B.** Розтягнення зв'язок суглоба
- C.** Розрив м'язів
- D.** Забій м'яких тканин
- E.** Перелом плеча

32. У флаконі 1,0 г цефтриаксону, його розвели 5 мл. ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- A.** 1,5 мл
- B.** 2 мл
- C.** 3 мл
- D.** 4 мл
- E.** 5 мл

33. На ФАП звернулась вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Загальний стан не порушений. АТ- 120/80 мм рт.ст. на обох руках. Рс-82/хв., ритмічний. Об'єктивно: тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе під час пальпації. Який попередній діагноз?

- A.** Загроза викидня
- B.** Викидень, що розпочався
- C.** Загроза передчасних пологів
- D.** Викидень у розпалі
- E.** Загроза розриву матки

34. Фельдшер ШМД доставив хворого з підозрою на внутрішню кровотечу внаслідок розриву селезінки. Групу крові визначили за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Через 2,5-3 хвилини оцінили результат: реакція аглютинації відбулась з цоліклоном анти-А, з анти-В відсутня. Яка група крові у хворого?

- A.** А(II)
- B.** 0(I)
- C.** В(III)
- D.** АВ(IV)
- E.** Помилка при визначенні групи

35. Фельдшер швидкої допомоги транспортує до стаціонару пацієнтку, в якої почалося блювання у вигляді "кавової гущі". Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнці?

- A.** Покласти на епігастральну ділянку міхур з льодом
- B.** Застосувати теплу грілку
- C.** Промити шлунок
- D.** Посадити пацієнтку
- E.** Дати випити теплою чаю

36. Фельдшер ФАПу стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином пероксиду водню. Чим потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

- A.** Стерильний ізотонічний розчин
- B.** Дистильована вода
- C.** Розчин фурациліну 1:5000
- D.** 2% розчин натрію гідрокарбонату
- E.** 0,5% розчин нашатирного спирту

37. При виконанні фельдшером швидкої допомоги внутрішньовенного вливання 10% розчину кальцію хлориду пацієнт 53-х років відчув пекучий біль у місці ін'єкції. Що повинен зробити фельдшер?

- A.** Обколоти місце ін'єкції 0,5% розчином новокаїну
- B.** Ввести у місце ін'єкції 0,1% розчин адреналіну
- C.** Прикласти міхур з льодом
- D.** Вище місця ін'єкції накласти джгут
- E.** Обколоти місце ін'єкції 2,4% розчином еуфіліну

38. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із переліченого є першочерговим при наданні невідкладної допомоги?

- A.** Ввести роторозширювач та зафіксувати язик
- B.** Виміряти артеріальний тиск
- C.** Дати кисень
- D.** Дати наркоз
- E.** Ввести еуфілін

39. Жителька села звернулась до

фельдшера ФАПу зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри та сухість, схильність до фурункульозу. До якого найбільш інформативного дослідження крові необхідно підготувати хвору?

- A.** На вміст глюкози
- B.** На вміст сечовини
- C.** Загальний аналіз
- D.** Печінкові проби
- E.** Біохімічний аналіз

40. Хворий після падіння з дерева відчув сильний біль у правій поперековій ділянці, який іррадіює в статеві органи. При обстеженні виявлено порушення м'язів правої поперекової ділянки, позитивний симптом Пастернацького. Гематурія. Які дії медпрацівника?

- A.** Терміново госпіталізувати до урологічного відділення
- B.** Покласти грілку на поперекову ділянку
- C.** Ввести баралгін
- D.** Заспокоїти хворого
- E.** Вести спостереження за станом хворого

41. Пацієнтка 19-ти років скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болісність при сечовипусканні. Об'єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка:

- A.** Задне склепіння піхви
- B.** Анальний отвір
- C.** Уретра
- D.** Цервікальний канал
- E.** Бокове склепіння піхви

42. Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64-х років із матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку виникли серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров'янисті, за типом "м'ясних помиїв", з'явилися болі внизу живота. Яка патологія найбільш імовірна?

- A.** Рак матки
- B.** Неповний аборт
- C.** Міхуровий занесок
- D.** Хоріонепітеліома
- E.** Внутрішній генеральний ендометріоз

43. До фельдшера ФАПУ звернулась жінка 22-х років зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 39,5°C. Об'єктивно: ЧСС- 108/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий у гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у гіпогастрії. Піхвове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, задне склепіння піхви нависає, різко болісне. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Пельвіоперитоніт
- B.** Гострий аднексит
- C.** Гострий ендометрит
- D.** Позаматкова вагітність
- E.** Апоплексія яєчника

44. Дівчину 17-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи, під час нападу, буває блювання. Напад триває декілька годин. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A.** Мігрень
- B.** Вегето-судинна дистонія
- C.** Субарахноїдальна гематома
- D.** Гіпертонічний криз
- E.** Транзиторний ішемічний напад

45. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 42-х років із скаргами на нападopodobний кашель з незначним виділенням слизисто-гнійного харкотиння, яке тяжко відкашлюється, задишку. Об'єктивно: діжкоподобна грудна клітка, аускультативно - сухі свистячі хрипи при форсованому видосі. Про яке захворювання можна думати?

- A.** Хронічний обструктивний бронхіт
- B.** Гострий бронхіт
- C.** Негоспітальна пневмонія
- D.** Сухий плеврит
- E.** Ексудативний плеврит

46. При дослідженні пульсу у тяжкохворого фельдшер визначив, що його частота дорівнює 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?

- A.** Брадикардія
- B.** Аритмія
- C.** Тахікардія
- D.** Пароксизмальна тахікардія
- E.** Ниткоподібний

47. У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- A.** Натиснути на корінь язика
- B.** Зробити прохолодну клізму
- C.** Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгін
- D.** Ввести підшкірно 1% р-н нікотинової кислоти
- E.** Ввести внутрішньовенно преднізолон

48. Фельдшера ФАПУ викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворій відмічалась слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- A.** Транзиторна ішемічна атака
- B.** Ішемічний інсульт
- C.** Геморагічний інсульт
- D.** Субарахноїдальний інсульт
- E.** Тромбоемболія судин мозку

49. Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка висуває скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39°C. Об'єктивно: живіт болісний у правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення 6x4 см. Це клінічні ознаки такого захворювання:

- A.** Гострий холецистит
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий апендицит
- D.** Хвороба Крона
- E.** Неспецифічний виразковий коліт

50. В приймальне відділення достав-

лено хворого 20-ти років без свідомості. В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС- 105/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

- A.** Інсулін
- B.** 5% розчин глюкози
- C.** 0,1% розчин адреналіну
- D.** Реополіглюкін
- E.** 0,9% розчин натрію хлориду

51. У хворій 44-х років, що страждає на хворобу Верльгофа, періодично з'являються плямисті геморагії на шкірі і посилюються маткові та носові кровотечі. Що стало найбільш імовірною причиною даного захворювання?

- A.** Порушення тромбоцитопоезу
- B.** Порушення еритропоезу
- C.** Порушення лейкопоезу
- D.** Дефіцит вітаміну А
- E.** Дефіцит вітаміну Е

52. У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль у епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Об'єктивно: Рс- 100/хв., аритмічний, екстрасистолія. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз - $13,8 \cdot 10^9$ /л. ЕКГ - інтервал *ST* у відведеннях III та aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- A.** Гострий інфаркт міокарда
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий холецистит
- D.** Перфорація виразки шлунку
- E.** Харчова токсикоінфекція

53. Чоловік 22-х років скаржитись на головний біль, тупий біль у попереку. Тиждень тому переніс ангіну. Об'єктивно: обличчя одутле, сеча кольору "м'ясних помий", АТ- 160/110 мм рт.ст. Прийом бісептолу стан не поліпшив. Діагноз: гострий гломерулоне-

фрит. Які дії фельдшера?

- A.** Госпіталізація
- B.** Симптоматична терапія, залишити вдома
- C.** Патогенетична терапія, залишити вдома
- D.** Антибіотики, залишити вдома
- E.** Сульфаніламідні, залишити вдома

54. На ФАПі спостерігається першовагітна 20-ти років з анатомічно звуженим тазом II ступеня. В який термін вагітності необхідно її госпіталізувати в пологовий будинок?

- A.** 37-38 тижнів
- B.** 39-40 тижнів
- C.** 35-36 тижнів
- D.** У разі злиття навколоплідних вод
- E.** З початком пологової діяльності

55. Яка патологія пологової діяльності розвинулась у роділлі 24-х років, якщо після 8 годин нормальної пологової діяльності перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився?

- A.** Вторинна слабкість пологової діяльності
- B.** Дискоординована пологова діяльність
- C.** Первинна слабкість пологової діяльності
- D.** Надмірносильна пологова діяльність
- E.** Патологічний преліментарний період

56. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній у лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природних складках. Носо-губний трикутник блідий. Яке захворювання має місце у дитини?

- A.** Скарлатина
- B.** Менінгококова інфекція
- C.** Кір
- D.** Краснуха
- E.** Вітряна віспа

57. На ФАПі закінчився 3% розчин хлораміну для дезінфекції інструментарію. Скільки хлораміну необхідно взяти для приготування 2 л 3% розчину хлораміну?

- A.** 60 г
- B.** 20 г
- C.** 30 г
- D.** 40 г
- E.** 90 г

58. На прийомі у фельдшера ФАПу дитина 3-х місяців. Вигодовується грудним молоком, скарг немає. Дефіцит маси тіла 17%, підшкірно-жирова клітковина збережена на обличчі і кінцівках. Товщина підшкірно-жирового шару на животі 1 см, тургор тканин і еластичність знижені. Це свідчить про наявність у дитини:

- A.** Гіпотрофії II ст
- B.** Паратрофії
- C.** Гіпотрофії III ст
- D.** Гіпотрофії I ст
- E.** Гіпостатури

59. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на кашель з виділенням вранці гнійного харкотиння з неприємним запахом (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37,8°C. При огляді пальці мають вигляд "барабаних паличок", а нігті "годинникових скелець". Про яке захворювання можна думати?

- A.** Бронхоектатична хвороба
- B.** Пневмонія
- C.** Туберкульоз
- D.** Плеврит
- E.** Пневмоконіоз

60. Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на біль у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Для невідкладної допомоги фельдшер використовує в першу чергу:

- A.** Нітрогліцерин
- B.** Еуфілін
- C.** Димедрол
- D.** Натрію хлорид
- E.** Преднізолон

61. Фельдшер проводить бесіду зі

школярами на тему: "Профілактика карієсу". Звертає увагу на те, що захворювання можна попередити, якщо дотримуватись заходів профілактики і пропонує обмежити вживання в їжу:

- A.** Цукор, солодоці
- B.** Молоко, молочні продукти
- C.** Риба, м'ясо
- D.** Овочі, фрукти
- E.** Харчова сіль

62. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, мокнуття, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання запідозрив фельдшер?

- A.** Екзема
- B.** Кропив'янка
- C.** Атопічний дерматит
- D.** Токсикодермія
- E.** Нейродерміт

63. Фельдшер ФАПУ обстежує дитину на 5-й день хвороби з попереднім діагнозом ГРВІ. Стан хлопчика погіршився за рахунок посилення кашлю, нежиттю та появи плямисто-папульозного висипу спочатку за вухами, потім на шкірі тулуба і кінцівок. Яке захворювання відповідає перерахованим симптомам?

- A.** Кір
- B.** Вітряна віспа
- C.** Скарлатина
- D.** Менінгококова інфекція
- E.** Краснуха

64. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржить на біль у грудях, задишку. Під час обстеження з'ясувалось, що він багато років страждає на варикозне розширення вен, двічі був тромбофлебіт. Стан погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну

смерть. Що стало причиною смерті?

- A.** Тромбоемболія легеневої артерії
- B.** Інфаркт міокарда
- C.** Спонтанний пневмоторакс
- D.** Травма грудної клітки
- E.** Фібриляція шлуночків

65. У хворої 24-х років на другий день після підшкірного введення 2 мл 20% олійного розчину камфори з'явилися біль і ущільнення в ділянці ін'єкції. Яке ускладнення у хворої?

- A.** Інфільтрат
- B.** Алергійна реакція
- C.** Абсцес
- D.** Гематома
- E.** Некроз

66. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D₃:

- A.** З 10-14-го дня по 500-1000 МО
- B.** З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- C.** З 10-го дня по 2000 МО
- D.** На 2-му тижні по 4000 МО
- E.** На 2-му місяці життя по 500 МО

67. Фельдшер ФАПУ транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися дорогою, 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Дитина піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?

- A.** Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері
- B.** Спостерігати за новонародженим
- C.** Виміряти температуру тіла новонародженого
- D.** Здійснити клеймування пуповини
- E.** Провести профілактику офтальмії

68. Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПУ діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- A.** Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг
- B.** Внутрішньовенно гініпрал
- C.** Сублінгвально ніфідипін
- D.** Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- E.** Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

69. У дитини 8-ми років важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які показники аналізу крові супроводжують такий стан?

- A.** Лейкемічний провал
- B.** Лейкоцитоз
- C.** Пойкілоцитоз
- D.** Зсув лейкоцитарної формули вліво
- E.** Еозинофілія

70. У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка, кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

- A.** Дифтерія гортані
- B.** Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- C.** Вогнищева пневмонія
- D.** Обструктивний бронхіт
- E.** Набряк Квінке

71. На ФАП звернулася 34-річна жінка зі скаргами на затримку менструації на 1,5 місяця і кров'янисті виділення з піхви. В анамнезі одні пологи. При гінекологічному обстеженні: шийка "бочкоподібна", матка в *anteflexio*, тіло матки маленьке. Шийка матки розміром з жіночий кулак, цервікальний канал пропускає палець. Придатки не пальпуються. Виділення кров'янисті, густі. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Шийкова вагітність
- B.** Аборт у ходу
- C.** Рак шийки матки
- D.** Ерозія шийки матки
- E.** Трубна вагітність

72. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 65-ти років зі скаргами на нападоподібний надсадний кашель з виділенням незначної кількості кров'

янистого харкотиння, ниючі болі в правій половині грудної клітки, загальну слабкість, задишку, схуднення. Скарги з'явилися кілька місяців тому. Який попередній діагноз?

- A.** Рак легень
- B.** Міозит
- C.** Хронічний бронхіт
- D.** Пневмонія
- E.** Бронхіальна астма

73. На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на неможливість статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути на 1 см за задню спайку, піхва відсутня. Під час ректального обстеження матка не пальпується, визначається невеликий тяж. Для якої патології характерні такі дані?

- A.** Аплазія піхви та матки
- B.** Атрезія дівочої пліви
- C.** Атрезія піхви
- D.** Гіпоплазія піхви та матки
- E.** Аплазія піхви

74. Пацієнтка 30-ти років поскаржилась фельдшеру ФАПу на відсутність місячних впродовж останніх 7 місяців. Вагітності немає. Який попередній діагноз?

- A.** Аменорея
- B.** Гіпоменструальний синдром
- C.** Клімактеричний синдром
- D.** Гіперменструальний синдром
- E.** Післякастраційний синдром

75. У пацієнта 32-х років на тлі гіперемованої шкіри в ділянці вусів дрібні гноячки, жовті кірки, свербіж, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Яку патологію варто запідозрити?

- A.** Сикоз
- B.** Герпес простий
- C.** Кандидоз
- D.** Трихофітія
- E.** Туберкульоз шкіри

76. Вранці при огляді дітей в дитячому садку у 5-річної дівчинки виявили папульозно-везикулярний висип на волосяній частині голови. Про яке захворювання слід думати?

- A.** Вітряна віспа
- B.** Менінгококова інфекція
- C.** Скарлатина
- D.** Кір
- E.** Краснуха

77. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 75-ти років. Його турбують різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформація в ділянці ключиці. Якою пов'язкою необхідно виконати іммобілізацію при даній травмі?

- A.** Дезо
- B.** Черепашача
- C.** Хрестоподібна
- D.** Спіральна
- E.** Колосовидна

78. У дитини при нападі бронхіальної астми поверхнєве дихання з різко утрудненим видихом, наростає ціаноз, акроціаноз. Ефекту від використання сальбутамолу та еуфіліну немає. Що необхідно призначити?

- A.** 3% преднізолон 2-3 мг/кг
- B.** 2% супрастин 1-2 мг/кг
- C.** 5% р-н аскорбінової кислоти 0, 2 мл/кг
- D.** 1% димедрол 1 мг/кг
- E.** 50% анальгін 0,1 мл/рік життя

79. При обстеженні пацієнтки 23-х років за допомогою піхвових дзеркал виявили, що слизова піхви вкрита серозними нашаруваннями, кровить від дотику. Який попередній діагноз?

- A.** Гострий кольпіт
- B.** Рак піхви
- C.** Гострий цервіцит
- D.** Гострий вульвіт
- E.** Гострий метрит

80. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 53-х років, який скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 39,2°C, кашель із виділенням іржавого харкотиння, болі в нижній частині грудної клітки справа, які посилюються при кашлі, задишку. Об'єктивно: шкіра обличчя гіперемована, синюшність носогубного трикутника. ЧД- 46/хв. В легенях справа у підлопатковій ділянці: притуплений перкуторний звук; аускультативно - дихання з бронхіаль-

ним відтінком, вологі дрібнопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Крупозна пневмонія
- B.** Трахеїт
- C.** Вогнищева пневмонія
- D.** Бронхіт
- E.** Плеврит

81. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 42-х років із скаргами на сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадіння волосся, спотворення смаку (вживає крейду). Для якого синдрому характерні такі ознаки?

- A.** Сидеропенічний
- B.** Пухлинної інтоксикації
- C.** Анемічний
- D.** Геморагічний
- E.** Гемолітичний

82. Фельдшер прийшов на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отриманий результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- A.** 1000 г
- B.** 900 г
- C.** 800 г
- D.** 700 г
- E.** 600 г

83. При проведенні патронажу новонародженої дитини фельдшер ФАПу помітив на шкірі кінцівок і тулуба лущення та гіперемію. Порекондуйте лікарську рослину для проведення гігієнічної ванни:

- A.** Череда
- B.** Звіробій
- C.** Мати-й-мачуха
- D.** Липа
- E.** Подорожник

84. Фельдшеру швидкої допомоги надійшов виклик до хлопчика 4-х років. Об'єктивно: загальний стан порушений, дитина млява, неспокійна, температура тіла 39,7°C, ЧД- 32/хв., ЧСС- 140/хв. На шкірі спини, сідниць, стегнах, гомілкях спостерігаються геморагічні висипання неправильної "зірчастої" форми з некрозом в центрі. Яку невідкладну допомогу необ-

хідно надати на догоспітальному етапі?

- A.** Ввести левоміцетин, преднізолон, анальгін
- B.** Ввести супрастин, парацетамол, цефтріаксон
- C.** Ввести анальгін, димедрол, дексаметазон
- D.** Ввести сибазон, лазикс, парацетамол
- E.** Ввести піпольфен, бензилпеніцилін, строфантин

85. Хвора 34-х років скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, шум у вухах, задишку, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, тони серця ритмічні, систолічний шум на верхівці, АТ- 120/70 мм рт.ст. Рс- 84/хв. У крові: знижені гемоглобін, кольоровий показник. Який препарат треба призначити хворій?

- A.** Фенюльс
- B.** Вітамін А
- C.** Вітамін B₁₂
- D.** Вітамін С
- E.** Вітамін Е

86. До ФАПу звернулася жінка зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли після використання нового прального порошку. Об'єктивно: шкіра кисті та передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикулярні висипи. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Алергічно-контактний дерматит
- B.** Псоріаз
- C.** Нейродерміт
- D.** Токсикодермія
- E.** Піодермія

87. До фельдшера ФАПу звернулася жінка з хлопчиком 9-ти років, якого укусив бродячий собака. В нижній третині правого передпліччя кілька глибоких, неправильної форми ран, які помірно кровоточать, забруднені слиною тварини. Що з переліченого треба зробити в першу чергу?

- A.** Промити рану розчином мила
- B.** Ввести правцевий анатоксин
- C.** Накласти гемостатичну пов'язку
- D.** Виміряти артеріальний тиск
- E.** Застосувати грілку

88. Під час огляду хворого виявлено: набряк рогівки, спазм повік, слезотеча, світлобоязливність, зниження гостроти зору; зіниця неправильної форми, колір її змінений. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Гострий поверхневий кератит
- B.** Гострий напад глаукоми
- C.** Гострий кон'юнктивіт
- D.** Трахома
- E.** Гострий іридоцикліт

89. У дівчинки 1,5 років вологий кашель, задишка з утрудненим видом, ЧДР- 45/хв, дистанційні хрипи. Аускультативно - різнокаліберні вологі та свистячі сухі хрипи. Який препарат найдоцільніше ввести дитині?

- A.** Розчин еуфіліну в/в
- B.** Розчин строфантину в/в
- C.** Ампіцилін в/м
- D.** Цифран усередину
- E.** Розчин седуксену в/м

90. До ФАПу звернулася жінка 32-х років зі скаргами на тривалі і рясні менструації впродовж півроку, тягнучий біль внизу живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У крові: Нв- 90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

- A.** Міома матки
- B.** Рак тіла матки
- C.** Вагітність
- D.** Кістома яєчника
- E.** Дисфункціональна маткова кровотеча

91. У пацієнта 51-го року сильний головний біль, дзвін у вухах, нудота, АТ- 180/110 мм рт.ст. Який синдром спостерігається у пацієнта?

- А.** Гіпертензивний
- В.** Гострої серцевої недостатності
- С.** Гострої коронарної недостатності
- Д.** Хронічної недостатності кровообігу
- Е.** Гострої судинної недостатності

92. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болісний більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Апоплексія яєчника
- В.** Перекрут ніжки кісти яєчника
- С.** Позаматкова вагітність
- Д.** Гострий апендицит
- Е.** Фіброміома

93. До фельдшера ФАПУ терміново звернувся хворий, якого вжалила за губу бджола. Скаржиться на ядуху, нудоту, гавкаючий кашель. Об'єктивно: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична, дихання утруднене, осиплість голосу, артеріальний тиск у нормі. Фельдшер може запідозрити у хворого:

- А.** Набряк Квінке
- В.** Кропивницю
- С.** Напад бронхіальної астми
- Д.** Гострий алергічний риніт
- Е.** Анафілактичний шок

94. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 29-ти років, який у зв'язку із загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. Раптово підвищилась температура тіла, з'явився біль у суглобах, животі, на шкірі з'явилась геморагічна висипка з характерним симетричним розташуванням елементів, особливо на нижніх кінцівках. Відзначає червоний колір сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Геморагічний васкуліт
- В.** Гострий цистит
- С.** Гострий пієлонефрит
- Д.** Гострий гломерулонефрит
- Е.** Амліодоз нирок

95. Фельдшер ФАПУ спостерігає за осередком туберкульозної інфекції. Дитині 10-ти років проведена туберкулінова проба Манту. Які результати свідчать про позитивну пробу у дитини?

- А.** Папула 6 мм
- В.** Папула 20 мм
- С.** Гіперемія 5 мм
- Д.** Папула 3 мм
- Е.** Гіперемія 10 мм

96. До ФАПУ звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні пацієнта спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров'янистим вмістом. Який це ступінь відмороження?

- А.** III
- В.** I
- С.** II
- Д.** III б
- Е.** IV

97. До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль у ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ФАПУ. Об'єктивно: збудження, червоні плями на обличчі, шії, Рс- 110/хв., АТ- 180/110 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- А.** Гіпертонічний криз I типу
- В.** Гіпертонічний криз II типу
- С.** Харчове отруєння
- Д.** Інфаркт міокарда
- Е.** Напад стенокардії

98. Фельдшер ФАПУ обстежує хворого 55-ти років, який скаржиться на погіршення зору, слабкість у ногах і руках, пекучий біль в них, який зменшується при ходінні босоніж. 20 років хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: гіпостезія в руках і ногах, за типом "рукавичок" та "шкарпеток". Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- А.** Діабетична полінейропатія
- В.** Облітеруючий ендартеріїт
- С.** Попереково-крижовий радикуліт
- Д.** Мієліт
- Е.** Поліомієліт

99. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте, болісне сечовипускання, сеча каламутна, температура тіла $37,6^{\circ}\text{C}$. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- A.** Хронічний пієлонефрит
- B.** Хронічний гломерулонефрит
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Гострий гломерулонефрит
- E.** Нирковокам'яна хвороба

100. Фельдшер ФАПУ, прибулий на місце події, діагностував у потерпілого 28-ми років відкритий перелом кісток тазу з ушкодженням сечового міхура. З чого слід почати невідкладну допомогу?

- A.** Катетеризація сечового міхура
- B.** Введення знеболюючих засобів
- C.** Транспортна іммобілізація
- D.** Проведення туалету рани
- E.** Накладання асептичної пов'язки

101. У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламано на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

- A.** Мікроспорія
- B.** Поверхнева трихофітія
- C.** Парша
- D.** Псоріаз
- E.** Себорейна екзема

102. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий, якому багаторазово вводили внутрішньовенно ліки. Скаржиться на біль, гіперемію, наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?

- A.** Флебіт
- B.** Гематома
- C.** Інфільтрат
- D.** Сепсис
- E.** Некроз

103. Хворому призначено 32 ОД інсуліну. У фельдшера ФАПУ інсулінового шприца не було. Яку кількість інсуліну потрібно набрати у шприц

об'ємом 2 мл?

- A.** 0,8 мл
- B.** 0,9 мл
- C.** 0,7 мл
- D.** 0,5 мл
- E.** 0,3 мл

104. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура до 38°C , пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- A.** Лімфаденіт
- B.** Флегмона
- C.** Бешиха
- D.** Лімфангоїт
- E.** Правець

105. При обстеженні хворого фельдшер ФАПУ знайшов симптоми гострого гастриту, які з'явилися у хворого після тривалого вживання низки фармакологічних препаратів. Який з препаратів здатний спричинити такі симптоми?

- A.** Вольтарен
- B.** Но-шпа
- C.** Сенаде
- D.** Валеріана
- E.** Корвалол

106. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- A.** Постійний
- B.** Змінний
- C.** Імпульсний
- D.** Модульований
- E.** Високочастотний

107. Під час активного патронажу матери дівчинки 12-ти місяців звернулася із запитанням до фельдшера ФАПУ: "Скільки зубів повинно бути у моєї дитини?"

- A.** 8
- B.** 12
- C.** 6
- D.** 13
- E.** 4

108. Вагітна 26-ти років з терміном вагітності 34 тижні звернулася до фельдшера швидкої допомоги зі скаргами на біль у епігастральній ділянці, блювання, миготіння "мушок" перед очима, посмикування м'язів обличчя. Об'єктивно: АТ- 180/120 мм рт.ст. на обох руках, генералізовані набряки. Вкажіть, які анестезіологічні та реанімаційні заходи необхідно провести жінці в першу чергу:

- A.** Призначити засоби, які попереджують судоми
- B.** Забезпечити ефективну вентиляцію легень (ШВЛ)
- C.** Призначити гіпотензивні засоби
- D.** Призначити дезагреганти
- E.** Провести корекцію водно-електролітних порушень

109. В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні діти обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме спостереження?

- A.** 7
- B.** 21
- C.** 14
- D.** 10
- E.** 3

110. Фельдшер швидкої медичної допомоги за призначенням лікаря ввів пацієнту в/в струменево 25% розчин магнію сульфату. Під час венепункції була здійснена наскрізна перфорація вени. Вкажіть можливе ускладнення:

- A.** Гематома
- B.** Інфільтрат
- C.** Некроз
- D.** Тромбофлебіт
- E.** Повітряна емболія

111. У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхнєве нерівномірне дихання, Ps- 56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні реанімаційних за-

ходів:

- A.** Ушкодження печінки
- B.** Перелом ребер
- C.** Гематома грудної клітки
- D.** Відкритий пневмоторакс
- E.** Гостра емфізема

112. У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задихка, виділення рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: над легеньми вислуховуються дрібно- та середньопухирчасті вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Гостра лівошлуночкова недостатність
- B.** Гостра судинна недостатність
- C.** Гостра дихальна недостатність
- D.** Легенева кровотеча
- E.** Шлунково-кишкова кровотеча

113. Фельдшера ШМД викликали до хворого 42-х років у якого спостерігаються відчуття голоду, загальна слабкість, виражена вологість шкірних покривів, тремор кінцівок, гіперкінезія. Через декілька хвилин пацієнт знепритомнів. Зіниці розширені, тонус очних яблук збережений, дихання часте, поверхнєве. В анамнезі: цукровий діабет. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A.** Гіпоглікемічна кома
- B.** Напад бронхіальної астми
- C.** Напад стенокардії
- D.** Гіпертензивний криз
- E.** Гіперглікемічна кома

114. Пацієнт 53-х років з хронічною недостатністю кровообігу лікується серцевими глікозидами. Викликав ШМД з приводу втрати апетиту, нудоти, блювання, перебоїв у роботі серця. Передозування якого препарату, в першу чергу, викликало погіршення самопочуття пацієнта?

- A.** Дигітоксин
- B.** Нітросорбід
- C.** Рибоксин
- D.** Аспаркам
- E.** Гіпотіазид

115. У пацієнта, який впродовж години знаходився на вулиці при температурі -29°C , скарги на оніміння

щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна чутливість знижені. Яка першочергова заходи при наданні допомоги?

- A.** Розтерти рукою до почервоніння шкіри
- B.** Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов'язку
- C.** Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай
- D.** Накласти на уражені ділянки пов'язки з маззю Вишневського
- E.** Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ

116. Проводять обстеження потерпілого, який був збитий вантажівкою. Він знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчать вище перераховані симптоми?

- A.** Перелом основи черепа
- B.** Перелом склепіння черепа
- C.** Перелом носа
- D.** Перелом щелеп
- E.** Носова кровотеча

117. У роділлі фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Вкажіть характер лохий, що відповідатимуть даній ситуації:

- A.** Кров'янисті, в помірній кількості
- B.** Серозно-кров'янисті
- C.** Серозні
- D.** Прозорі
- E.** Гнійні

118. Під час транспортування у роділлі 25-ти років у машині ШМД почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хвилини, тривалістю 50 секунд. Починається прорізування голівки плоду. Промежина, висота якої 3 см, зблідлила. Яким має бути наступний етап невідкладної допомоги?

- A.** Епізіотомія
- B.** Захист промежини
- C.** Накладання акушерських щипців
- D.** Вакуум-екстракція плоду
- E.** Вичікувальна тактика

119. Фельдшер швидкої допомоги під час підшкірної ін'єкції олійного розчину камфори виявив, що у пацієнта виник раптовий біль, ціаноз верхньої

половини грудної клітки і обличчя. Назвіть ускладнення ін'єкції:

- A.** Жирова емболія
- B.** Повітряна емболія
- C.** Алергійна реакція
- D.** Колапс
- E.** Запаморочення

120. У дівчинки 10-ти років після фізичного навантаження, вживання жирної та смаженої їжі виникає неінтенсивний ниючий біль у ділянці правого підбер'я, що супроводжується нудотою, гіркотою в роті. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Дискінезія жовчних шляхів
- B.** Хронічний гастрит
- C.** Ентерит
- D.** Виразкова хвороба шлунка
- E.** Коліт

121. Пацієнтка 22-х років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. При огляді: витрішкуватість, тремтіння пальців рук, пальпується збільшена щитоподібна залоза, Рс- 120/хв, АТ- 160/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Тиреотоксикоз
- B.** Мікседема
- C.** Ендемічний зоб
- D.** Артеріальна гіпертензія
- E.** Нецукровий діабет

122. Фельдшера ШМД викликали до дитини 4-х місяців. Дитина втратила за добу 800 гр. маси тіла внаслідок блювання та проносу. Рефлекси слабкі, тургор тканин знижений, шкіра суха, сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, стан важкий. Який стан у дитини?

- A.** Кишковий токсикоз з ексикозом
- B.** Гіпотрофія
- C.** Паратрофія
- D.** Гіпервітаміноз D
- E.** Рахіт

123. У дитини 7-річного віку астеничної конституції спостерігаються підвищена нервова збудливість, надмірна вразливість, енурез, періодично виникають напади ацетонемічного блювання. Для якого захворювання

характерні дані симптоми?

- A. Нервово-артритичний діатез
- B. Алергічний діатез
- C. Геморагічний діатез
- D. Лімфатико-гіпопластичний діатез
- E. Ексудативно-катаральний діатез

124. До фельдшера ФАПу звернулась жінка, яка під час консервування облила ліву ногу окропом. Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом "дев'ятки":

- A. 18%
- B. 9%
- C. 1%
- D. 27%
- E. 36%

125. Ви фельдшер ФАПу даєте поради по годуванню дитини 6-ти місяців з функціональним розладом травлення після водно-чайної паузи. Скільки разів на добу доцільно годувати дитину?

- A. 7
- B. 4
- C. 5
- D. 8
- E. 10

126. На ФАП доставлений хворий у стані алкогольного сп'яніння, який тривалий час пролежав на вулиці у снігу. Об'єктивно: температура тіла знижена до $31 - 30^{\circ}\text{C}$, шкіра холодна, мармурово-ціанотична, відсутність міміки, безглуздий погляд потерпілого. Ps- 32/хв., слабого наповнення. АТ- 100/60 мм рт.ст. ЧД- 8/хв., поверхневе. Температура в прямій кишці знижена $28 - 30^{\circ}\text{C}$. Який ступінь замерзання у хворого?

- A. II
- B. III
- C. IV
- D. V
- E. I

127. При обстеженні пацієнтки виникла підозра на непрохідність маткових труб. Яке дослідження може це підтвердити?

- A. Гістеросальпінгографія
- B. Вишкрібання слизової оболонки матки
- C. Зондування матки
- D. Кольпоскопія
- E. Пункція заднього склепіння

128. У роділлі 30-ти років через 10 хвилин після народження дитини з'явилися переймоподібні болі внизу живота, бажання тужитися, затискач, накладений на пуповину біля статевої щілини, зміщується донизу, з піхви виділилось 100 мл крові. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Третій період нормальних пологів
- B. Гіпотонія матки
- C. Справжнє прирощення плаценти
- D. Щільне прикріплення плаценти
- E. Затримка плаценти в порожнині матки

129. У разі судом на фоні спазмофілії треба вводити:

- A. Внутрішньовенно 10% р-н кальцію глюконату 0,2 мл/кг
- B. Внутрішньом'язово 25% р-н магнію сульфату
- C. Внутрішньом'язово 0,5% р-н седуксену
- D. Внутрішньом'язово 1% р-н лазиксу
- E. Внутрішньом'язово фенобарбітал 10 мг/кг

130. До фельдшера ФАПу звернулася жінка, мати двох дітей, яка скаржиться на наявність вузлів м'яко-еластичної консистенції по зовнішній поверхні лівого стегна з переходом на гомілку і появи набряку на лівій стопі до кінця робочого дня. Після нічного відпочинку набряк проходить. Початок хвороби пов'язує з вагітністю і пологамі. Користується еластичними панчолами. Сформулюйте попередній діагноз:

- A. Варикозне розширення підшкірних вен лівої гомілки
- B. Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої гомілки
- C. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен лівої гомілки
- D. Облітеруючий ендартеріт лівої нижньої кінцівки
- E. Слоновість лівої нижньої кінцівки

131. Пацієнт 60-ти років з цирозом печінки висловлює скарги на слабкість, холодний піт, запаморочення, випорожнення чорного кольору. Вдома короткочасно знепритомнів. Об'єктивно: Рs- 102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Кровотеча з розширених вен стравоходу
- B.** Виразка дванадцятипалої кишки, що кровоточить
- C.** Пухлина шлунку
- D.** Кровотеча з пухлини легенів у фазі розпаду
- E.** Пухлина товстої кишки

132. На ФАП звернувся пацієнт, прооперований у хірургічному відділенні місяць тому з приводу перфоративної виразки 12-палої кишки. Скарги на різкі нападоподібні болі у животі, які тривають близько години, багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт під час нападу. Живіт м'який, болісний у всіх відділах. Випорожнень не було. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- A.** Спайкова кишкова непрохідність
- B.** Абсцес черевної порожнини
- C.** Метеоризм
- D.** Рецидив виразкової хвороби 12-палої кишки
- E.** Перитоніт

133. У пацієнта 43-х років після введення внутрішньом'язово біциліну виникли сильний головний біль, шум у вухах, біль за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об'єктивно: стан хворого важкий, Рs- 115/хв., ниткоподібний, АТ- 70/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу?

- A.** Адреналін
- B.** Атропін
- C.** Допамін
- D.** Мезатон
- E.** Строфантин

134. Робітник 39-ти років звернувся до фельдшера здоров'я пункту зі скаргами на пекучий біль шкіри правої ноги. Під час роботи в лабораторії випадково розлив на ногу сірчану ки-

слоту. З чого треба розпочати надання першої допомоги?

- A.** Промивання струменем холодної води
- B.** Направлення до опікового центру
- C.** Виконання хімічної нейтралізації
- D.** Накладання пов'язки з фурациліном
- E.** Промивання етиловим спиртом

135. Фельдшер ШМД оглядає потерпілого з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. При наданні першої допомоги провів тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута, ввів потерпілому знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- A.** Накладання захисної асептичної пов'язки
- B.** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- C.** Холод на місце травми
- D.** Імобілізація пошкодженої кінцівки
- E.** Надання хворому зручного положення

136. Мати привела на ФАП хлопчика 3-х років, у якого спостерігаються смердючі виділення з правої половини носа та утруднення дихання через праву половину носа, що виникли 2 дні тому на фоні повного здоров'я. Який попередній діагноз?

- A.** Стороннє тіло правої половини носа
- B.** Гострий риніт
- C.** Гострий правобічний гайморит
- D.** Озена
- E.** Гострий правобічний фронтит

137. Під час огляду новонароджена дитина млява, адинамічна, природжені рефлекси знижені, крик "мозковий", спостерігається тремор, ністагм, випинання великого тім'ячка. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A.** Внутрішньочерепна пологова травма
- B.** Гемолітична хвороба новонароджених
- C.** Пневмонія
- D.** Фізіологічна жовтяниця
- E.** Сепсис новонароджених

138. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру – $37,6^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі кіста яєчника. Бімануально - матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, тугорухоме. Встановіть діагноз:

- A.** Перекрут ніжки кісти яєчника
- B.** Порушена позаматкова вагітність
- C.** Апоплексія яєчника
- D.** Гострий аднексит
- E.** Розрив капсули кісти яєчника

139. На прийомі у фельдшера ФАПу мати із дівчинкою 7 місяців. Дитина перебуває на грудному вигодовуванні. Профілактика рахіту не проводилась. Фруктово-овочеві продукти, соки не отримує. При об'єктивному обстеженні виражені лобні і тім'яні бугри. Велике тім'ячко має розмір 3×3 см, краї його потовщені, на ребрах чотки, виражена м'язова гіпотонія, симптом "жаб'ячого" живота. Дитина погано спирається на ніжки. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Рахіт II, підгострий перебіг
- B.** Рахіт I, гострий перебіг
- C.** Рахіт II, гострий перебіг
- D.** Гіпотрофія I ступеня
- E.** Гіпотрофія II ступеня

140. Хворий 47-ми років доставлений ШМД з діагнозом "гострий інфаркт міокарда", став відмічати різке погіршення самопочуття: посилився біль за грудниною, з'явилася задишка, запаморочення. Об'єктивно: Ps- 120/хв., тони серця глухі, рясне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A.** Кардіогенний шок
- B.** Серцева астма
- C.** Гостра судинна недостатність
- D.** Стенокардія
- E.** набряк легень

141. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 30-ти років зі скаргами на остуду, відчуття голоду, неспокій. В анамнезі: пацієнт страждає на цукровий діабет 1-го типу. Об'єктивно: пацієнт збуджений, шкіра тепла, профузний піт, неадекватна поведінка. Рівень глюкози у крові $2,0$ ммоль/л. Назвіть першочергові заходи невідкладної допомоги:

- A.** Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 40% розчину глюкози
- B.** Внутрішньовенне струминне введення 5 мл 40% розчину глюкози
- C.** Внутрішньовенне краплинне введення 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду
- D.** Підшкірне введення 40 ОД інсуліну
- E.** Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 5% розчину глюкози

142. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 45-ти років, який два тижні тому отримав колоту рану правої кисті. Пацієнт скаржиться на слабкість, утруднення ковтання, судоми жувальних м'язів, пітливість. При об'єктивному обстеженні фельдшер помітив сіпання м'язів під час доторкання пінцетом до рани, підвищений тонус м'язів кінцівки, підсилення сухожильних рефлексів. Фельдшер запідозрить таке захворювання:

- A.** Правець
- B.** Дифтерія рани
- C.** Сибірка
- D.** Газова інфекція
- E.** Гнильна інфекція

143. До фельдшера ФАПу звернувся постраждалий на 4-ту добу після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна. Стан постраждалого раптово став погіршуватись. Скарги на розпираючий біль у рані в середній третині стегна. Біль посилюється за останні 12 годин. набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла $38,2^{\circ}\text{C}$, Ps- 102/хв. Краї рани зяють, тьмяні, м'язи вибухають у рані,

при захваті пінцетом тканини розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані?

- А. Анаеробна інфекція
- В. Аеробна грамнегативна інфекція
- С. Гнильна інфекція
- Д. Аеробна грампозитивна інфекція
- Е. Дифтерія рани

144. Пацієнт 40-ка років скаржиться на відчуття стиснення і болі за грудниною. При кашлі - пінисті виділення яскраво-червоного кольору. Із анамнезу відомо, що хворіє на туберкульоз легень впродовж 10-ти років. Який препарат слід застосувати першочергово?

- А. 12,5% розчин етамзілату, 2 мл в/в
- В. 1% розчин вікасолу, 1,0 мл в/м
- С. 5% розчин аскорбінової кислоти
- Д. 10% розчин кальцію хлориду
- Е. Преднізолон

145. До пацієнтки 20-ти років, яка страждає на наркоманію, виїхала бригада ШМД. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардія. Що терміново показано хворій?

- А. ШВЛ
- В. Оксигенотерапія
- С. Призначення налорфіну
- Д. Форсований діурез
- Е. Інфузійна терапія

146. Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C , слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті та болісні сечовипускання, нетримання сечі. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

- А. УЗД нирок
- В. Рентгеноурологічне
- С. Екскреторна урографія
- Д. Цистоскопія
- Е. Мікційна цистографія

147. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х років. Зі слів матері, дитина приблизно 45 хвилин тому випадково з'їла 8 таблеток тазепаму. Батьками ніякі медичні втручання не проводилися. Якими повинні бути дії фельдшера?

- А. Промити шлунок до чистих промивних вод
- В. Поставити очисну клізму
- С. Спостерігати за дитиною
- Д. Ввести в/в крапельно 0,9% розчин натрію хлориду
- Е. Госпіталізувати у відділення інтенсивної терапії

148. Фельдшер проводить серцево-легеневу реанімацію потерпілому, у якого констатовано клінічну смерть. Що з нижчеперерахованого вказує на ефективність закритого масажу серця?

- А. Пульсація на сонній артерії
- В. Зниження температури тіла
- С. Розширені зіниці
- Д. Пасивні рухи грудної клітки
- Е. Відсутність свідомості

149. Чоловік 28-ми років звернувся до фельдшера здоровпункту із скаргами на підвищення температури тіла, спонтанний біль у ділянці кінчика носа, набряклість навколишніх тканин. При огляді виявлено конусоподібне випинання при вході у ніс, шкіра носа гіперемована, напружена і дуже чутлива. Хворий працює у лабораторії з агресивними хімічними агентами. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- А. Фурункул носа
- В. Бешиха носа
- С. Відмороження носа
- Д. Опік носа
- Е. -

150. Фельдшер на виклику у замінної жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- А. Порушена позаматкова вагітність
- В. Апоплексія яєчника
- С. Прогресуюча позаматкова вагітність
- Д. Перекрут ніжки кісти
- Е. Розрив піосальпінксу